




QE927  
.E85













LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN

# DIE EOCENE FLORA DES MONTE PROMINA.

VON PROF. DR. CONSTANTIN A. ETTINGSHAUSEN,  
CORRESPONDIRENDEM MITGLIEDE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

(MIT XIV TAFELN)

(VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE AM XVI. FEBRUAR MDCCCLIV.)

In neuester Zeit hat man das Alter der zur eocenen Epoche gezählten Tertiärfloren vielfach angezweifelt und sich bemüht, die Gleichzeitigkeit aller bis jetzt aus der tertiären Formation gewonnenen Floren als höchst wahrscheinlich zur Geltung zu bringen. Den mächtigsten Impuls hiezu gab die von Leopold von Buch in seiner Schrift über die Lagerung der Braunkohlen in Europa aufgestellte Ansicht, dass die verschiedenen Lagerstätten von Braunkohlen dieses Welttheiles und die selbe begleitenden fossilen Pflanzenreste nur Einer Epoche zufallen, welche der Nummuliten- oder Eocen-Periode folgte, sonach als mittel-tertiär zu bezeichnen wären. Diese Ansicht wurde von allen jenen mit grossem Beifalle aufgenommen, welche die Schwierigkeiten der genaueren Bestimmung des Alters einzelner Localitäten von Kohlen und Pflanzenresten in der Tertiärformation durch eigene Untersuchung kennen gelernt haben. In der That ist die Grenze zwischen dem Eocenen und Mioenen in der Flora keineswegs so scharf ausgesprochen, wie dies in der Fauna der Tertiärformation sich zeigt. Otto Weber fand in den immerhin als mioenen zu bezeichnenden Braunkohlen-Localitäten der niederrheinischen Formation viele Arten, welche die als eocen geltende Flora von Sotzka lieferte; Fischer-Oster entdeckte eocene Pflanzenarten in einigen Localitäten der Schweizer Molasse. Mir selbst wurde bei der Durchforschung der Vorkommen von tertiären Pflanzenresten in der österreichischen Monarchie eine Localität — das Kohlenlager bei Fohnsdorf in Steiermark — bekannt, deren fossile Flora ihrem Charakter nach zwischen die beiden tertiären Zeitabschnitte zu fallen scheint, indem die Anzahl von solchen Arten, welche die eocene Periode charakterisiren, der Zahl von eigentlich mioenen Formen nahezu gleichkommt. Die fossile Flora von Sagor in Krain, obwohl mit Sotzka sehr analog, birgt manche miocene Formen.

Dessungeachtet erschien es einigen Forschern gewagt, nach diesen Thatsachen hin sich zu der Annahme bestimmen zu lassen, dass die Verschiedenartigkeit, nach welcher wir die tertiären Floren bis jetzt in mioene und eocene zu trennen suchten, in localen Verhältnissen ihre Ursache habe, und dass es keine eigentlich eocenen Floren gäbe.

Bei dieser Sachlage kann die Entdeckung einer unzweifelhaft eocenen Flora, als welche sich unsere in gegenwärtiger Schrift bearbeitete Flora herausstellt, nur als ein sehr erwünschtes Ereigniss betrachtet werden. Am Monte Promina, nordöstlich von Sebenico in Dalmatien, einer bekannten Braunkohlen-Localität, deren Reichthum an Pflanzenresten bereits Leopold von Buch in oben gedachter Schrift erwähnt, fanden sich in Schichten von Kalkmergel und Mergelschiefer, welche ihren Lagerungsverhältnissen nach mit der

Kohle und den sie bedeckenden, Pflanzenreste führenden Schichten gleichzeitig sind, Nummuliten und andere die Eocenformation bezeichnende Versteinerungen. Die k. k. geologische Reichsanstalt verdankt den Bemühungen der Herren G. Schlehan, Director der adriatischen Steinkohलगewerkschaft zu Sieverich, G. Rösler, k. k. Oberbergamts-Assessor, und Dr. Lanza, Professor der Naturgeschichte zu Zara, eine reichhaltige Sammlung der trefflich erhaltenen Pflanzenfossilien und der Thierversteinerungen. Die wichtigsten Fundorte sind nach der Angabe des Herrn Schlehan: die Mergel bei der Quelle Velki Totschek und der Barbara-Stollen bei Sieverich, am südöstlichen Abhange des 3653 Fuss hohen, aus abwechselnden Schichten von Kalkeonglomerat und Mergeln bestehenden Monte Promina. An der letzteren Localität erreicht die Braunkohlenablagerung ihre grösste Mächtigkeit, 6—10 Klafter. Das Hangende derselben bildet ein blaulicher, meist sehr bituminöser Mergelschiefer, welcher zahlreiche Pflanzenreste, darunter die interessante *Goniopteris dalmatica* A. Braun, in vorzüglicher Häufigkeit enthält. Über diesen liegt in einer Mächtigkeit von 8—12 Klaffern ein gelblicher, leicht spaltbarer, oft kalkreicher Mergelschiefer, dessen untere Lagen sich ebenfalls sehr reich an Pflanzenfossilien zeigen, namentlich an Dikotyledonen-Blättern, Zweigen von *Araucarites Sternbergii* Göpp., Fieder-Fragmenten von *Goniopteris polypodioides* Ett. u. a. Die oberen Schichten hingegen führen durchaus keine Pflanzenreste, vielmehr besonders häufig Mollusken. Über diesen Schichten tritt ein an Thierversteinerungen mitunter reicher Nummuliten-Kalk in verschiedener Mächtigkeit auf.

Nach den von meinem geehrten Freunde, Herrn Bergrathe Franz v. Hauer, vorgenommenen Untersuchungen gehören alle Thierfossilien, welche in den angegebenen über der Kohle liegenden Schichten bis jetzt aufgefunden werden konnten, sicher der Eocenformation an und tragen entschieden den Typus der Arten der alpinen Nummuliten-Formation. Die meisten Arten kommen nur als Steinkerne vor und sind daher schwer genauer zu bestimmen; doch konnten die nachfolgenden Arten mit ziemlicher Sicherheit erkannt werden:

*Neritina conoidea* Desh.,  
*Melania stygii* Brongn.,  
*Natica sigaretina* Desh.,  
*Turritella asperula* Al. Brong.,

*Melania costellata* Lam.,  
*Rostellaria fissurella* Lam.,  
*Pholadomya Puschii* Goldf.

Ausserdem fanden sich Arten der Geschlechter *Bulla*, *Voluta*, *Oliva*, *Cardium* u. s. w.

Wir gehen nun zu der Schilderung der allgemeinen Vegetationsverhältnisse über, welche sich aus den Special-Untersuchungen der einzelnen Fossilreste schöpfen liessen.

Die bis jetzt aus den Schichten des Monte Promina gewonnenen Pflanzenfossilien konnten zu 71 Arten gebracht werden, welche sich in 26 Ordnungen dergestalt vertheilen, dass vier Arten auf zwei Ordnungen der Thallophyten, sechs Arten auf drei Ordnungen der Endsprosser, fünf Arten auf drei Ordnungen der Umsprosser, eine Art auf die nacktsamigen, 21 Arten auf sechs Familien der apetalen, zehn Arten auf drei Familien der gamopetalen und 24 Arten auf 8 Ordnungen der dialypetalen Endumsprosser fallen.

Drei Arten, nämlich: *Sphaerorocrites flabelliformis*, *Delesserites sphaerocorroides* und *Chondrites dalmaticus*, müssen ihren in der Flora der Jetztwelt lebenden Analogien zu Folge als Meeresbewohner; fünf Arten, nämlich: *Conferrites capilliformis*, *Caulinites articulatus*, *Zosterites affinis*, *Nelumbium Buchii* und *Nelumbium nymphaeoides*, als Süsswassergewächse; drei Arten, *Equisetites Erbreichii*, *Typhaelepisum haeringianum* und *Vaccinium acheronticum*, als Sumpfpflanzen, die übrigen als eigentliche Festlandpflanzen im engeren Sinne betrachtet werden.

Diese letzteren können wir weiters, auf Grundlage der von ihren zunächst verwandten jetzt lebenden Gewächsen bekannten Vegetationsbedingungen, in folgende Gruppen nach der muthmasslichen Beschaffenheit ihres Wohnortes abtheilen.

An dünnen, sandigen oder felsigen, über das Meeresniveau nur wenig erhabenen Stellen wuchsen: die *Santalum*-Arten, einige *Proteaceen*, vorzüglich *Petrophiloides Richardsoni*, *Banksien* und vielleicht einige



kleinblättrige Sapotaceen und Myrtaceen. Auf felsigen, buschigen Anhöhen oder solchen Abhängen der Hügel und niederen Berge oder an ähnlichen Orten der Thäler konnten vorzüglich die Daphnogene- und Laurus-Arten, die Flabellarien, Arten von *Adiantum* und *Pisonia*, *Araucarites Sternbergii*, die Mehrzahl der Proteaceen, besonders Banksia- und Dryandra-Arten, einige Celastrineen, die Sterculia, die meisten Sapotaceen, Ericaceen, Rhamneen, Myrtaceen und Leguminosen sich vergesellschaften; während *Artocarpidium Ephialtae*, *Apocynophyllum plumeriaefolium*, *Dombeyopsis Phillyrae*, die Ficus-Arten, diesen eingereiht und untergeordnet einige Cassieen, schlingende Celastrineen, *Malpighiastrum dalmaticum* und Filices, die Hauptbestandtheile der dichter und feuchten Wälder der fossilen Flora des Monte Promina bildeten.

Ergibt sich aus der Vergleichung dieser Flora mit den Florengeländen der Jetztwelt einerseits der rein tropische Charakter, wie er nur an den als eocen bestimmten Tertiärfloren bis jetzt erkannt worden ist, so stellt sich anderseits durch die Vergleichung unserer Flora mit den bekannten tertiären Localfloren (siehe beifolgende Tabelle) ihre grosse Ähnlichkeit mit den Floren von Sotzka und von Häring evident heraus, während die Verschiedenheit ihres Charakters von dem der Floren von Parschlug, Bilin, Radoboj, Wien und anderer Mioecenfloren eben so entschieden hervorgeht. Schon auf den ersten Blick fällt, wie bei den erstgenannten Floren, das Vorwiegen der schmalen lederartigen, am Rande gezähnten Proteaceen und der ebenfalls schmalen ganzrandigen derben Blätter von Myrtaceen auf, vieler anderer Repräsentanten der neuholländischen Vegetation nicht zu gedenken, die bei näherer Untersuchung sich zu erkennen geben. Breite Blattformen mit bogenlängiger Nervation und eigentliche Randläufer, welche die Mioeengebilde vorwiegend charakterisiren, kommen hier selten zum Vorschein; die ersteren entsprechen meist tropischen Dikotyledonen, als: Ficus, *Artocarpus*, *Dombeya*, einigen Geschlechtern der Laurineen, Apocynaceen, Malpighiaceen u. s. w. Im Ganzen trägt diese Flora so wie die von Sotzka, Häring und Sagor den Typus der neuholländischen Vegetation an sich.

Die dieser Flora eigenthümlichen Arten fallen zum grössten Theile solchen Geschlechtern zu, welche überhaupt in der Flora der Tertiärperiode vorzugsweise repräsentirt sind. Doch mahnen einige Formen niederer Gewächse, Florideen, Sphenopterideen, Pecopterideen, an die Flora der Kreidezeit.

Nach Erwägung dieser Ergebnisse können wir die oben erwähnte Ansicht Leopold von Buch's nicht theilen. Gleichzeitig mit der Fauna der Nummuliten-Formation sind die fossilen Floren von Monte Promina, Monte Bolea, Häring, Sotzka, Eperies und Sagor; den Faunen der Mioeen-Periode entsprechen die Localfloren von Fohusdorf, Parschlug, Leoben, Trofajach, Gleichenberg, Eibiswald, Wien, Schauerleiten bei Pitten, Bilin, Altsattel, Radoboj, Tokay, der niederrheinischen Braunkohlenformation, u. a.

### Übersicht der Arten der fossilen Flora des Monte Promina, ihres Vorkommens und ihrer Analogien.

Aufzählung der Arten.	Vorkommen in analogen Localfloren der Eocen-formation.			Vorkommen in anderen Tertiärfloren.	Analogien in vorweltlichen Floren.	Analogien in der Flora der Jetztwelt.
<b>Regio Thallophyta.</b>						
Classis Algae.						
Ordo Confervaceae.						
<i>Confervites capilliformis</i> Ett.	Häring	—	—	. . . . .	<i>C. bilineus</i> Ung. Bilin.	Conferva-Arten, Süsswasserb.
Ordo Florideae.						
<i>Sphaerococcites flabelliformis</i> Ett.	—	—	—	. . . . .	<i>Sphaerococcites alcornis</i> Ett. Häring.	
<i>Delesscrites sphaerococcoides</i> Ett.	—	—	—	. . . . .	. . . . .	<i>Del. alata</i> u. <i>sinuosa</i> .
<i>Chondrites dalmaticus</i> Ett.	—	—	—	. . . . .	<i>Ch. Turgionii</i> Sterb. Kreide- und Neococen-F.	<i>Chondria</i> sp. pl.

Aufzählung der Arten.	Vorkommen in analogen Localfloraen der Eocen- formation.			Vorkommen in anderen Tertiär- Floraen.	Analogien in vor- weltlichen Floraen.	Analogien in der Flora der Jetztwelt.
<b>Regio Cormophyta.</b>						
<b>Sectio I. Aerobrya.</b>						
Ordo Equisetaceae.						
<i>Equisetites Erbreichii</i> Ett.	—	—	—	.....	<i>Equis. Braunii</i> Ung. Parsehlug, Kindbg., Piesting, Oeningen.	<i>Equisetum</i> -Arten.
Ordo Sphenopterideae.						
<i>Sphenopteris eocenica</i> Ett.	—	—	—	.....	<i>Sph. recentior</i> Ung. Radoboj.	
<i>Adiantites Schlehani</i> Ett.	—	—	—	.....	<i>Adiant. Freyeri</i> Ung. Radoboj.	<i>Adiant. subcordatum</i> Swartz. Brasilien.
Ordo Polypodiaceae.						
<i>Goniopteris dalmatica</i> A. Braun.	—	—	—	Cilli in Untersteier- mark, Eocen-F.	<i>Gon. Braunii</i> Ett.	<i>Aspidium Eckloni</i> Kunze. Cap.
„ <i>polypodioides</i> Ett.	—	—	—	.....	<i>Gon. stiriaca</i> Brong.	<i>Goniopter. prolifera</i> Presl.
<i>Blechnum Braunii</i> Ett.	—	—	—	.....	<i>Taeniopteris dentata</i> Sternb.	<i>Blechnum striatum</i> R. Brown. Neuhol.
<b>Sectio II. Amphibrya.</b>						
Ordo Najadeae.						
<i>Caulipites artienlatus</i> Ett.	Häring	—	—			
<i>Zosterites affinis</i> Ett.	Häring	—	—	.....	<i>Z. marina</i> Ung. Radoboj.	<i>Zostera</i> -Arten.
Ordo Typhaceae.						
<i>Typhuloipum haeringianum</i> Ett.	Häring	—	—	.....	<i>T. maritimum</i> Sagor. Radob., Bilin, Oening.	
Ordo Palmae.						
<i>Flabellaria raphifolia</i> Stbg.	Häring	Sotzka	—	Lausanne i. d. Schweiz. Aix, Vinnacourt in Frankr.; Mioe.-F.		
„ <i>Lutania</i> Rossm.	—	—	—	Altsattel, Böhmen Ra- doboj, Bonn; Mioe- cen-F.		
<b>Sectio III. Acramphibrya.</b>						
Ordo Abietinae.						
<i>Araucarites Sternbergii</i> Göpp.	Häring	Sotzka	—	Stein und Laak in Krain, Kostenblatt, Wittingau in Böh- men, Blocksberg bei Ofen; Mioeen-F.		
Ordo Moraceae.						
<i>Ficus dalmatica</i> Ett.	—	—	—	.....	{ <i>F. Hydrachos</i> Ung.} { <i>F. pannonica</i> Ett.}	Mehrere Ficus-Arten.
„ <i>Jynx</i> Ung.	Häring	Sotzka	—			
„ <i>Morloti</i> Ung.	—	Sotzka	—			
Ordo Artocarpeae.						
<i>Artocarpidium Ephialtae</i> Ett.	—	—	—	.....	<i>A. integrifol.</i> Ung. Sotzka, Häring.	
Ordo Nyctagineae.						
<i>Pisonia eocenica</i> Ett.	Häring	Sotzka	Sagor	.....	.....	{ <i>Pisonia Brunoniana</i> Endl. Norfolk. <i>Pisonia aculeata</i> L. Amer. trop.

Aufzählung der Arten.	Vorkommen in analogen Localflora der Eocen- formation.			Vorkommen in anderen Tertiär- Flora.	Analogien in vor- weltlichen Flora.	Analogien in der Flora der Jetztwelt.
Ordo Laurineae.						
<i>Daphnogene polymorpha</i> Ett.	Häring	Sotzka	Sagor	Radoboj, Fohnsdorf, Arnfels, Eibiswald, Leoben, Parschlug, Wildshuth, Wien, Altsattel, Bilin, Swo- szowieze, Erlau, St. Gallen, Oeningen, Mombach, Salzhausen, Bonn; Mioeen-F.		Ostindische Cinna- momum-, Cam- phora u. Litsaea- Arten.
„ <i>lanceolata</i> Ung.	Häring	Sotzka	Sagor			
„ <i>grandifolia</i> Ett.	Häring	Sotzka	—			
„ <i>cinnamomifolia</i> Ung.	Häring	—	—	Radoboj, Parschlug, Altsattel, Bonn, Oeningen; Mioe.-F.		
<i>Laurus Lalages</i> Ung.	Häring	Sotzka	Sagor			
„ <i>pachyphylla</i> Ett.	—	—	—	. . . . .	<i>L. Swoszowie.</i> Ung. Swoszow., Wien etc.	
Ordo Santalaceae.						
<i>Santalum acheronticum</i> Ett.	Häring	Sotzka	Sagor	Parschlug, Radoboj, Erdöbénye b. Tokay.	. . . . .	<i>Santalum</i> sp. Neuh.
„ <i>salicinum</i> Ett.	Häring	Sotzka	Sagor	. . . . .	. . . . .	<i>Sant. obtusifolium</i> Brown. Neuholl. <i>Sant. Preissianum</i> Miq. Neuholland.
„ <i>osyrium</i> Ett.	Häring	Sotzka	—	. . . . .	. . . . .	<i>Sant. lanceolatum</i> R. Br. Neuholl. <i>Osyris</i> sp. pl.
Ordo Proteaceae.						
<i>Petrophiloides Richardsoni</i> Ett.	—	—	—	Insel Sheppy; Eoe.-F.	. . . . .	Petrophila- und Iso- pogon-Arten. Neu- holland.
<i>Banksia longifolia</i> Ett.	Häring	Sotzka	Sagor	Fohnsdorf, Steierm.; Blocksberg b. Ofen; Mioeen-F.	. . . . .	<i>Banksia spinulosa</i> R. Brown. Neu- holland.
„ <i>haeringiana</i> Ett.	Häring	Sotzka	Sagor	. . . . .	<i>B. prototypa</i> Ett. Niedersehöna; K.-F.	<i>Banksia collina</i> R. Brown. Neuhol.
„ <i>Ungeri</i> Ett.	Häring	Sotzka	Sagor	. . . . .	. . . . .	<i>(Banksia attenuata)</i> R. Brown. Neuh. <i>Banksia littoralis</i> R. Brown. Neuh. <i>Banksia serrata</i> R. Brown. Neuh.
„ <i>dillenoides</i> Ett.	Häring	—	—	. . . . .	. . . . .	<i>B. dilleniaefolia.</i> Kn. et Sal.
<i>Dryandra Brongniartii</i> Ett.	Häring	—	—	Eperies, Ungarn; Eoe.- F.; Arnissan, Cler- mont, Schweiz; M.-F.	<i>Dryandra antiq.</i> Ett. Grünsand, Skandin.	<i>Dryandra formosa</i> R. Brown. Neuh.
<i>Dryandroides hakeufolia</i> Ung.	Häring	Sotzka	—			
Ordo Apocynaceae.						
<i>Apocynophyllum plumeriaefolium</i> Ett.	—	—	—	. . . . .	. . . . .	Mehrere Plumeria- u. Allamanda-Arten.
Ordo Sapotaceae.						
<i>Bumelia oblongifolia</i> Ett.	—	—	—	. . . . .	<i>B. ambigua</i> Ett. Wien; Mioe.-F.	

Anföhlung der Arten.	Vorkommen in analogen Localflören der Eöcen- Formation.			Vorkommen in anderen Terliär- Flören.	Analogien in vor- weltlichen Flören.	Analogien in der Flora der Jetztwelt.
<i>Bumelia Oreadum</i> Ung.	Häring	Sotzka	Sagor	Radoboj, Fohnsdorf, Bonn; Mioeen.-F.	. . . . .	<i>Bumelia nervosa</i> W. Trop. Amer.
<i>Sapotacites Daphnes</i> Ett.	—	—	—	Parsehlug, Schemnitz; Mioeen-F.	. . . . .	<i>Sideroxylon</i> -und <i>Aeh- ras</i> -Arten.
„ <i>raccinioides</i> Ett.	Häring	Sotzka	—	. . . . .	. . . . .	<i>Bassia</i> - und <i>Bumelia</i> - Arten.
„ <i>ambiguus</i> Ett.	Häring	Sotzka	—	. . . . .	. . . . .	<i>Mimusops Caffra</i> E. May. Cap.
Ordo Ericaceae.						
<i>Andromeda protogaea</i> Ung.	Häring	Sotzka	Sagor	Heiligenkreuz, Sza- kadat, Wittingau; Mioeen-F.	. . . . .	<i>Andromeda euca- lyptoides</i> D. Cand. Brasilien.
<i>Gautiera cocinea</i> Ett.	—	—	—	. . . . .	<i>Gaut. lignitum</i> Web. Bonn. Mioeen-F.	<i>Gautiera acumi- nata</i> Sehl. et. Nordamerika.
<i>Vaccinium acheronticum</i> Ung.	—	Sotzka	—	Radoboj, Parsehlug.	. . . . .	<i>Rhododendr. punc- tatum</i> Beh. Nord- amerika.
<i>Rhododendron Saturni</i> Ett.	—	—	—	. . . . .	. . . . .	
Ordo Nelumbonae.						
<i>Nelumbium Buchii</i> Ett.	—	—	—	. . . . .	. . . . .	<i>Nelumb. speciosum</i> Willd. Asien.
„ <i>nymphacoides</i> Ett.	—	—	—	. . . . .	. . . . .	
Ordo Büttneriaceae.						
<i>Domheyopsis Philgrae</i> Ett.	—	—	—	. . . . .	<i>Db. tiliuefolia</i> Ung. Sotzka, Eöcen-F.; Öeningen, Bilin, Bonn, Kainberg, Tokay; Mioeen-F.	
„ <i>grandifolia</i> Ung.	—	—	—	Bilin, Leoben, Kainbg., Prevali, Willdshuth, Bonn.		
Ordo Sterculiaceae.						
<i>Sterculia Labrusca</i> Ung.	—	Sotzka	Sagor	. . . . .	. . . . .	<i>Sterc. diversifolia</i> G. Don. Neuhollland.
Ordo Malpighiaceae.						
<i>Malpighiastrum dalmaticum</i> Ett.	—	—	—	. . . . .	. . . . .	
Ordo Celastrineae.						
<i>Celastrus Phlegenthontis</i> Ett.	—	—	—	. . . . .	<i>Celastrus europaeus</i> Ung. Radoboj, Par- sehlug; Mioeen-F.	
„ <i>Andromedae</i> Ung.	—	Sotzka	—	. . . . .	. . . . .	<i>Celast. glaucus</i> Sall.
„ <i>orcophilus</i> Ung.	Häring	Sotzka	—	. . . . .	<i>Celastrus pachyphyl- lus</i> Ett. Häring.	<i>Celastrus pterocar- pus</i> D. Cand. Cap.
Ordo Rhamneae.						
<i>Rhamnus Roesleri</i> Ett.	—	—	—	. . . . .	. . . . .	<i>Rhamnus</i> - und <i>Po- maderris</i> -Arten.
<i>Ceanothus zizyphoides</i> Ung.	Häring	Sotzka	—	. . . . .	. . . . .	<i>Zizyphus incurra</i> Roxb. Neapel. <i>Zizyphus sinensis</i> Lam. Asien.

Aufzählung der Arten.	Vorkommen in analogen Localflora der Eocen- Formation.			Vorkommen in anderen Tertiär- Flora.	Analogien in vor- weltlichen Flora.	Analogien in der Flora der Jetztwelt.
Ordo Myrtaceae.						
<i>Callistemophyllum melaleuca- forme</i> Ett.	Häring	Sotzka	Sagor	. . . . .	. . . . .	{ <i>Callistemon glau- cum</i> D. C. Neuh., <i>Callist. salignum</i> D. C. Neuh.
<i>Callistemophyllum diosmoides</i> Ett.	Häring	Sotzka	—	. . . . .	. . . . .	Melaleuca- u. Calli- stemon-Art., Neuh.
<i>Eucalyptus oceanica</i> Ung.	Häring	Sotzka	Sagor	. . . . .	<i>Eucalyptus haer- ingiana</i> Ett. Häring.	Mehrere Eucalyptus- Arten, Neuholland.
<i>Eugenia Apollinis</i> Ung.	Häring	Sotzka	Sagor	. . . . .	. . . . .	<i>Eugenia sinensis</i> , Asien, Neuholland.
Ordo Papilionaceae.						
<i>Dalbergia primaeva</i> Ung.	—	Sotzka	Sagor	. . . . .	<i>Dalberg. haeringiana</i> Ett.	<i>Mesonchurum Cum- mingianum</i> Fenzl Ins. Philipp.
<i>Sophora europaea</i> Ung.	Häring	Sotzka	Sagor	Radoboj, Erdöbénye b. Tokay; Mioe. F.	. . . . .	Caesalpinia-Arten.
<i>Caesalpinia norica</i> Ung.	—	Sotzka	—	Monte Bolea; Eoc. F.	. . . . .	<i>Caesalpinia sepiaria</i> Roxb. Ostindien.
„ <i>Haidingeri</i> Ett.	Häring	—	—	. . . . .	. . . . .	<i>Cassia colutroides</i> Coll. Chili.
<i>Cassia ambigua</i> Ung.	Häring	—	—	Parschlug, Fohnsd., Bilin, Wien, Radob., Tokay, Oeningen; Mioeen.-F.	. . . . .	<i>Cassia ruscifolia</i> Jacq. Madeira.
„ <i>Zephyri</i> Ett.	Häring	—	—	. . . . .	. . . . .	{ <i>Cassia corymbosa</i> Linn. Trop. Am.
„ <i>hyperborea</i> Ung.	Häring	Sotzka	Sagor	Parschlug, Radoboj, Bonn; Mioeen.-F.	. . . . .	<i>Cassia laevigata</i> Willd. Trop. Am.
„ <i>Diones</i> Ett.	—	—	—	. . . . .	. . . . .	Cassia-Arten.
„ <i>Phascolites</i> Ung.	Häring	Sotzka	—	Radoboj; Mioeen.-F.	. . . . .	{ <i>Cassia micranthera</i> D. Cand. Brasil. <i>Cas. gemminiflora</i> Coll. Mexico.

## Beschreibung der Arten.

### REGIO I. THALLOPHYTA.

#### Ordo CONFERVACEAE.

##### *Confervites capilliformis* Ettingsh.

Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring in Tirol. Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt, Bd. II, Abth. 3, Nr. 2, p. 23, Taf. 4, Fig. 1.

Taf. XIV, Fig. 4.

*C. filamentis simplicibus elongatis tenuissimis, capillaceis, strictis, fragilibusque, fasciculatim aggregatis.*

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina Dalmatiae, nec non in calcareo-bituminoso ad Häring Tirolis.

Diese Confervacee erhielt ich durch Herrn Bergmeister Schlehan nur in dem einzigen vorliegenden Exemplare. Sie theilt alle Charaktere mit dem von mir in den Eocen-Schichten von Häring aufgefundenen und a. a. O. beschrie-



benen *Conferrites capilliformis*, daher ich dieselbe vorläufig der genannten Art jedoch mit der Bemerkung einreihe, dass erst vollständiger erhaltene Exemplare sichere Aufschlüsse über die systematische Stellung dieser Süßwasser-alge geben können.

### Ordo FLORIDEAE.

#### ***Sphaerococcites flabelliformis* Ettingsh.**

Taf. I, Fig. 2, 3.

Sph. fronde plana vel subplicata, coriacea, flabelliformi, digitatim ramosa, ramis abbreviatis, fere lato-lanceolatis vel ovatis, longitudinaliter plicatis vel striatis.

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Diese interessante Algen-Form mag in unserer vorweltlichen Flora häufiger vorgekommen sein, da aus den Schichten des Monte Promina eine grössere Anzahl von Fragmenten derselben gewonnen wurden.

#### ***Delesserites sphaerococcoides* Ettingsh.**

Taf. I, Fig. 1.

D. fronde plana, dichotome ramosa, tenue membranacea, ramis cuneatis, ramulis lato-linearibus integerrimis, obtusis, sinu acutissimo divisis, ramis ramulisque nervo mediano pinnato percursis, venis simplicibus vel furcatis.

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Die gabelspaltige Verästelung des flachen, fächerförmig ausgebreiteten Laubes erinnert an *Sphaerococcus*. Jedoch ist die Nervation des Laubes, der gefiederte an der Theilung der Äste und Ästchen gabelspaltige Mediannerv den Formen des genannten Geschlechtes fremd. Dieselbe kommt vielmehr einigen *Delesseria*-Arten zu. Unsere Art theilt den Habitus des Laubes mit *Delesseria alata*, die Nervation mit *D. sinuosa*.

#### ***Chondrites dalmaticus* Ettingsh.**

Taf. I, Fig. 4, 5.

Ch. fronde pinnatim ramosa, ramis simplicibus, elongatis, linearibus, aequilatis, approximatis, inferioribus suboppositis, patentibus.

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Die vorliegenden Fragmente einer *Chondrites*-Art, welche sich hier fanden, gleichen auf den ersten Blick so sehr den Formen des in den Schichten der Kreide und des Neocomien vorkommenden *Chondrites Targionii* Sternb., dass man geneigt sein könnte, selbe mit letzterer Art zu vereinigen. Bei näherer Vergleichung unserer Fossilreste mit einer hinreichenden Anzahl von Exemplaren des *Chondrites Targionii* spricht sich jedoch folgende nicht unbedeutende Differenz in der Tracht aus: die Äste des Laubes sind verhältnissmässig steifer und daher mehr gerade; die mittleren und unteren stehen sparrig, unter nahezu rechtem Winkel von der Spindel ab, unter einander fast parallellaufend. Dies ist schon an dem Fragmente Fig. 4, auffallend aber an Fig. 5, welches Exemplar den unteren Theil des Laubes darstellt, ersichtlich. Ausserdem stehen die Äste, wie es scheint ziemlich constant, sich fast gegenüber, was sogar bei den unteren, weiter von einander entfernten der Fall ist.

Die angegebenen Charaktere bestimmten mich, diese Formen als die Reste einer besonderen, mit der genannten Kreide-Alge zunächst verwandten *Chondrites*-Art zu betrachten.

## REGIO II. CORMOPHYTA.

## SECTIO I. ACROBRYA.

## Ordo EUISETACEAE.

***Equisetites Erbreichii*** Ettingsh.

Taf. I, Fig. 6, 7.

E. caule simplici, diametro 4—5 millim., articulado, tenuiter striato, articulis inaequilongis, vaginatis, vaginis brevissimis, tenuiter crenulatis, adpressis.

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Von dem neuerlich auch in eocenen Schichten beobachteten *Equisetites Bramii* Ung. durch die sehr kurzen, fein gekerbten Scheiden leicht zu trennen. Ich benenne die Art zu Ehren des Herrn geheimen Bergrathes Erbreich in Berlin, welcher sich um die Aufsammlung der Pflanzenfossilien des Monte Promina verdient gemacht.

## Ordo SPHENOPTERIDAE.

***Sphenopteris cocenica*** Ettingsh.

Taf. II, Fig. 3—8.

S. fronde bipinnata, pinnulis oblongis vel lanceolatis, acutis, inaequaliter inciso-dentatis vel pinnatifidis, erecto-patentibus, approximatis, dentibus aut lobis ovatis acutis, rarius obtusis, integerrimis vel crenulatis; nervis tenuibus pinnatis, nervulis furcatis.

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Diese in den Pflanzenreste führenden Mergelschichten des Monte Promina nicht selten vorkommende Sphenopteris-Art hat auf dem ersten Blicke viele Ähnlichkeit mit der bis jetzt nur aus der Flora von Radoboj bekannten *Sphenopteris recentior* Ung., mit welcher sie auch Leopold v. Buch verwechselt zu haben scheint (siehe dessen „Lagerung der Braunkohlen in Europa“ Ber. d. k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1831, p. 686). Bei näherer Vergleichung unterscheidet sie sich aber von derselben leicht durch den nur zweifach-getiederten Wedel und die länglichen oder lanzettlichen, spitzen, ungleichförmig eingeschnitten-gezähnten oder fiederspaltigen Fiederehen.

***Adiantites Schlehani*** Ettingsh.

Taf. XIV, Fig. 3.

A. fronde pinnatim composita, pinnulis membranaceis, circ. 23 millim. longis, 17 millim. latis, sessilibus, subrotundis, basi cordatis, margine denticulatis vel integerrimis, venis flabellato-dichotomis.

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Diese interessante Art, welche ich Herrn Director Schlehan, dem man die Aufsammlung und sorgfältige Aufbewahrung vieler und seltener Reste des Monte Promina zu verdanken hat, widme, unterscheidet sich von *Adiantites Freyeri* Ung. durch die rundlich-keilförmigen, an der Basis abgerundet-herzförmigen, am Rande fein- und entfernt-gezähnelten Fiederehen.

Einige Formen der vielgestaltigen Fiederehen der sterilen Wedel von *Adiantum subcordatum* Swartz aus Brasilien zeigen mit dieser Art sowohl in der Form als Nervation manche Ähnlichkeit.

## Ordo POLYPODIACEAE.

***Goniopteris dalmatica*** A. Braun.

Alex. Braun, über fossile Goniopteris-Arten, Zeitschrift d. deutschen geol. Gesellschaft, Jahrg. 1833, p. 338, Taf. 14, Fig. 2—4.

Taf. I, Fig. 8, 9.

G. fronde pinnata, pinnis anguste linearibus, breviter petiolatis, elongatis, 7—12 centm. longis, circ. 1 centm. latis, pinnatifidis, lobis triangularibus, obtusiusculis vel rotundatis; nervis secundariis e

nervo primario sub angulis  $70-90^\circ$  orientibus, pinnatis, ramulis alternantibus leviter curvatis, parallelis, intimis basilaribus.

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina, nec non ad Cilli Stiriae inferioris.

Die Reste dieses interessanten Farren, welche Herr Prof. Alex. Braun a. a. O. trefflich schildert und abbildet, gehören jedenfalls zu den häufigeren Pflanzenfossilien des Monte Promina, da alle Sendungen, welche mir von daher zukamen, dieselben in grosser Anzahl enthielten.

Herr Prof. Braun führt als Analoga seiner *Goniopteris dalmatica* eine Reihe von grösstentheils in den Tropen lebenden Filices an, als: *Aspidium gonyolodes* Schkr. auf den Antillen und Surinam, *A. fecundum* Wall. aus Nepal, *A. Pohliannum* Presl. aus Brasilien, *A. resiniferum* Kaulf. von den Sandwich-Inseln, *A. propinquum* R. Brown. aus Neuholland und *A. Eckloni* Kunze vom Cap. Die letztere Art steht der fossilen unstreitig am nächsten.

### ***Goniopteris polypodioides* Ettingsh.**

Taf. II. Fig. 1—4; Taf. III. Fig. 5.

G. fronde pinnata, rachide primaria sulcata, pinnis lineari-lanceolatis, breviter petiolatis, remote dentatis vel integerrimis: nervis secundariis 4—5 millim. inter se distantibus, minus distinctis, e nervo primario sub angulis  $30-60^\circ$  orientibus, pinnatis, ramulis alternantibus, leviter arcuatis, parallelis, intimis basilaribus; soris medio ramulorum insertis.

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

In den vorliegenden Wedelfragmenten eines Farren, welche in den Kalkmergelschichten am Barbara-Stollen bei Sieverich keineswegs selten vorkommen, ist ebenfalls das Geschlecht *Goniopteris* mit Sicherheit zu erkennen; und zwar haben wir hier entweder die *Goniopteris stiriaca* Brongn. oder eine neue, dieser sehr nahe verwandte Art voruns. Erstere charakterisirt sich durch einen einfach gefiederten Wedel mit linealen, sitzenden, am Rande gesägten Fiedern und scharf hervortretenden, 2—3 Millm. von einander entfernten fiederästigen Secundärnerven, deren sanft gekrümmte Ästchen über ihrer Mitte die sehr kleinen Sporangienhäufchen tragen<sup>1)</sup>.

Die hier in Betrachtung stehenden Formen kommen in allen diesen Merkmalen der bezeichneten Art sehr nahe, zeigen aber bei näherer Vergleichung folgende Abweichungen: Die Fieder des ebenfalls einfach gefiederten Wedels sind kurz gestielt (wie aus Fig. 1 und 2 ersichtlich), breitlanzettförmig, gegen die Spitze allmählich verschmälert, an der Basis wenig verschmälert oder abgerundet, am Rande entfernt-gezähnt oder fast ganzrandig. Die in Abständen von 4—5 Millm. entspringenden Secundärnerven sind feiner, treten weniger scharf hervor und werden nur durch die oft zwischenliegenden Falten bemerklicher. Hingegen sind die Fiederästchen derselben deutlicher ausgesprochen, dem unbewaffneten Auge stets erkennbar und tragen die Sporangienhäufchen in der Mitte oder selbst innerhalb derselben. Auf die eben erörterten Unterschiede hin glaube ich diese *Goniopteris*-Form von *G. stiriaca* trennen zu sollen.

Unter den jetzt lebenden Arten dürfte der *Goniopteris polypodioides* die *Goniopteris prolifera* Presl. am nächsten stehen.

### ***Blechnum Braunii* Ettingsh.**

Taf. XIV. Fig. 2.

B. fronde simpliciter pinnata, pinnis subcoriaceis, linearibus, elongatis, circ. 11 centim. longis, 1 centim. latis, margine subtilissime crenulatis; venis e costa mediana sub angulo acuto orientibus, tenuissimis, creberrimis rectis, parallelisque; sporangia in soros lineales geminos, costae medianae utrinque parallelas continuos disposita.

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Herr Prof. Braun erwähnt in seiner Schrift „über fossile *Goniopteris*-Arten“ l. c. S. 338 eines Farrenkrautes vom Monte Promina, welches er wegen seiner Ähnlichkeit mit *Tacniopteris dentata* Sternb., die nach fructificirenden,

<sup>1)</sup> Das von Unger in der *Iconographia plantarum fossilium* als *Goniopteris stiriaca* abgebildete Farrenfragment von Radoboj kann, da es eine vom Nerventypus des Geschlechtes *Goniopteris* wesentlich verschiedene Nervenbildung zeigt, sicherlich nicht hierher gehören.

im Berliner Museum aufbewahrten Exemplaren eine *Blechnum*-Art ist<sup>1)</sup>, zu diesem Geschlechte bringt. Durch Herrn Director Schlehan zu Sieverich erhielt ich nun das hier abgebildete Fiederfragment eines Farren, welches wohl am besten mit *Blechnum*-Arten verglichen werden kann und sich von *Tacniopteris dentata* nur durch die schmälere Form der Fieder, die feine Zähnelung des Randes und die zahlreichen sehr genäherten Secundärnerven unterscheidet. Ich habe diese interessante, bis jetzt noch unbenannt gebliebene Art zu Ehren ihres ersten Entdeckers benannt.

Von den gegenwärtig lebenden *Blechnum*-Arten entspricht unserer Art in jeder Beziehung *Blechnum striatum* R. Brown (*Blechnopsis striata* Presl) aus Neuholland.

## SECTIO II. AMPHIBRYA.

### Ordo NAJADEAE.

#### *Caulinites articulatus* Ettingsh.

Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring in Tirol, Abhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt, Bd. II, Abthl. 3, Nr. 2, Seite 28, Taf. 4, Fig. 13—15.

*C. caulibus ramosis, circ. 3 millm. latis, Equisetorum more articulatis, gracilibus, articulis aequalibus circ. 4 millm. longis, cicatricibus radiculorum adventivorum tuberculatis, tuberculis infra articulationem insilis, verticillatis.*

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina, nec non in bituminoso ad Häring.

Die dieser Bestimmung zu Grunde liegenden Exemplare stimmen bis auf die knötchenförmigen Narben der Adventivwurzeln mit den zu Häring vorkommenden des *Caulinites articulatus* genau überein.

#### *Zosterites affinis* Ettingsh.

Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring l. c. p. 29, Taf. 4, Fig. 21, 22.

Taf. III, Fig. 1.

*Z. caulibus striatis, nodosis, foliis anguste linearibus 1—2 millm. latis, nervosis, nervis pluribus tenuissimis parallelis vix distinctis.*

In schisto calcareo-bituminoso ad Häring et ad montem Promina.

Das auf angegebener Tafel abgebildete Pflanzenpetrefact erhielt ich durch Herrn Rösler. Es zeigt dieselben Reste einer monokotyledonen Pflanze, welche ich auch zu Häring in Tirol fand und wegen ihrer Ähnlichkeit mit den Blattresten des *Zosterites marina* Ung. zu diesem Geschlechte stellte. Die Unterschiede derselben von der genannten Art habe ich bereits in der oben citirten Schrift angegeben, worauf ich hier verweise.

### Ordo TYPHACEAE.

#### *Typhaeloipum haeringianum* Ettingsh.

Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring l. c. p. 30, Taf. 4, Fig. 20.

*T. foliis lato-linearibus, integerrimis, striatis, striis crebris approximatis parallelis, septis transversis vix distinctis.*

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina et in bituminoso ad Häring.

Wenn auch die nähere Bestimmung der mit obiger Bezeichnung aufgeführten, ebenfalls den Monokotyledonen angehörigen Fossilreste noch zweifelhaft ist, so stelle ich wenigstens die Thatsache fest, dass dieselben Reste, welche ich in den Schichten von Häring auffand und als *Typhaeloipum haeringianum* beschrieb, auch in den Eocen-Mergeln des Monte Promina vorkommen.

<sup>1)</sup> Ich hatte bei einem Aufenthalte in Berlin durch die Güte des Herrn Prof. A. Braun Gelegenheit, mich von der Richtigkeit dieser Angabe nach eigener Anschauung zu überzeugen.



## Ordo PALMAE.

***Flabellaria raphifolia* Sternh.**

Sternberg, Vers. I, Fasc. 2, p. 32; Fasc. 4, p. 34, Taf. 21. — Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring in Tirol, l. c. p. 30, Taf. 1, Fig. 1—9; Taf. 2, Fig. 1—6; Taf. 3, Fig. 1—2.

Taf. III, Fig. 4; Taf. XIV, Fig. 1.

F. foliis longe petiolatis, flabellato-pinnatis vel ad petiolum usque multifidis, pinnis vel lobis longissimis planis, linearibus, numerosis, congestis, rhachide in plano anteriore brevi, obtusa vel convexa, in plano posteriore ovata vel lanceolata, acula; nervis prominentibus, striatis, petiolo tereti, diametro  $1\frac{1}{2}$ —3 centm.

*Palmaeites flabellatus* Schlotheim, Petref. p. 393.

*Palmaeites oxyrhachis* Sternh., Vers. II, Taf. 42.

*Flabellaria oxyrhachis* Ung. in Mart. Gen. Palm., p. 61. — Gen. et spec. plant. foss., p. 330.

*Flabellaria Martii* Ung. in Mart. Gen. Palm., p. 62. — Gen. et spec. plant. foss. l. c.

*Flabellaria haeringiana* Ung., Chloris protog., p. 43, Taf. 14, Fig. 3. — Fossile Flora von Sotzka, Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften, Bd. II, S. 175, Taf. 23, Fig. 10.

*Flabellaria Lamanonis* Brongn., Prodr. p. 121. — Ung. Gen. et spec. plant. foss., p. 331.

In schisto calcareo bituminoso ad Häring Tirolis, in margaceo ad Sotzka Stiriae inferioris, ad Lausannum Helvetiae ad Aix et Vinnaecourt Galliae, nec non ad montem Promina.

Unstreitig dasselbe Palmenblatt, welches besonders häufig und in wohl erhaltenen Exemplaren unter den Pflanzen der Eocenschichten von Häring erscheint und von welcher wir eine Reihe verschiedener Entwicklungs-Formen in oben citirter Schrift abbildeten. Hier, wie auch bei Sotzka scheint diese Palme sehr selten zu sein.

***Flabellaria Lalania* Rossm.**

Rossmäessler, Beitr. zur Versteinerungskunde, Hft. I, p. 39, Taf. 41, Fig. 49. — Sternberg, Vers. II, p. 195, Taf. 40, Fig. 2.

Taf. III, Fig. 2, 3; Taf. IV, Fig. 1—3.

F. foliis longe petiolatis, laciniis rhachidi cylindricae, elongato-acuminatae sexpollicari insidentibus numerosis congestis longissimis linearibus, basi saepe ultra dimidiam unites, induplicatis, nervis secundariis plurimis approximatis, petiolo compresso, valido, dorso vero sulcato.

In calcareo-margaceo formationis eocenicae ad montem Promina, in arenaceo lignitum ad Altsattel Bohemiae, ad Rott prope Bonnam, nec non ad Radobojum Croatiae.

Die hier abgebildeten und einige andere Blattfragmente einer Palme, die sich am Monte Promina fanden, stimmen mit den in der Braunkohlen-Formation von Altsattel nicht selten erscheinenden Fragmenten der *Flabellaria Lalania*, von welcher ich auf Taf. IV einige Exemplare zur Vergleichung beigelegt habe, so genau überein, dass ich an ihrer Identität mit genannter Species kaum zweifeln kann. Leider konnte ich bis jetzt kein vollständigeres Fragment erhalten, um diese in der Tracht des Blattes ausgezeichnete Art für die Flora des Monte Promina mit grösserer Sicherheit nachzuweisen.

## SECTIO III. ACRAMPHIBRYAE.

## Ordo ABIETINEAE.

***Araucarites Sternbergii* Göpp.**

Göppert in Bronn's Geschichte der Natur, III, 2, p. 41. — Monographie der fossilen Coniferen, p. 236, Taf. 44, Fig. 1. — Unger, foss. Flora von Sotzka, Denkschriften der kais. Akad. der Wissenschaften, Bd. II, p. 157, Taf. 24, Fig. 1—14; Taf. 25, Fig. 1—7. — Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, Abhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt, Bd. II, Abthl. 3, Nr. 2, p. 36, Taf. 7, Fig. 1—10; Taf. 8, Fig. 1—12.

Taf. V, Fig. 1—3.

A. strobilis subglobosis, squamis numerosissimis, acumine recurvis, circ. 1 centm. longis, 2—3 millm. latis, imbricatis; ramis sparsis elongatis; foliis ovatis, ovato-lanceolatis, acutis vel acuminatis, sub-falcatis, basi decurrentibus, imbricatis, apice patentibus.

*Araucarites Goeperti* Sternh., Vers. II, p. 204. — Göppert, Monographie der fossilen Coniferen, p. 236, Taf. 44, Fig. 2.

*Cystoscirites dubius* Sternh., Vers. II, Taf. 9, Fig. 3, 6; Taf. 17, Fig. 1.



*Cystoxeirites laxiformis* Sternb., Vers. II, Taf. 18, Fig. 1—3.

*Juniperites cespitosa* Brongn., Transact. of Geol. Soc., VII, p. 373.

*Lycopodites cespitosus* Schloth., Petref., p. 416.

In schisto calcareo-bituminoso formationis eocenicae ad Häring, in calcareo-margaceo ad Sotzka Stiriae inferioris et ad montem Promina Dalmatiae; in schisto margaceo formationis miocenicae ad Stein et Laak Carinthiae, ad Kostenblatt prope Bilinum et ad Wittingau Bohemiae, nec non ad Blocksberg prope Budam Hungariae.

Die Reste dieser Conifere kommen am Monte Promina in gleicher Häufigkeit wie zu Sotzka und Häring vor. Die schlanken verlängerten Ästchen, die spitzen Winkel ihrer Einfügung und die oft verkürzten, weniger abstehenden Blätter — Merkmale, welche, wie ich bereits in meiner tertiären Flora von Häring l. c. erwähnte, die Art mehr mit *Dacrydium cupressinum* als mit *Araucaria excelsa* theilt — sind an den hier abgebildeten Exemplaren sehr deutlich ausgesprochen.

## Ordo MOREAE.

### *Ficus dalmatica* Ettingsh.

Taf. VII, Fig. 11.

F. foliis petiolatis, ovatis utrinque acutis, membranaceis, integerrimis, nervatione camptodroma, nervo primario versus apicem sensim evanescente, nervis secundariis infimis suprabasilaribus, sub angulo 30°, reliquis sub angulis obtusioribus orientibus, apice ramosis, nervis tertiariis tenuissimis rete laxum formantibus. Longt. circ. 6 centm., lat. 2 centm.

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Dem Habitus nach dürfte dieses Blatt dem Geschlechte *Ficus* zufallen. Die grundständigen Nerven entspringen unter spitzerem Winkel als die übrigen Secundärnerven, welche, spärliche Tertiärnerven absendend, ein Blattnetz zwischen sich fassen, das auch den einiger *Ficus*-Arten sehr ähnlich ist. Übrigens spricht weder die Form des Blattes noch seine membranöse Textur gegen die gewählte Geschlechtsbestimmung. Unter den vorweltlichen für *Ficus*-Formen erkannten Blättern sind zwei zu erwähnen, die sich mit unserer Art, besonders im Typus der Nervation nahe verwandt zeigen. Die eine ist *Ficus Hydrarchos* Ung. aus der fossilen Flora von Sotzka, die andere *Ficus punnonica* Ettingsh. der fossilen Flora von Tokay angehörend. Von beiden Formen unterscheidet sie sich durch den ganzen, weder buchtigen noch gezähnten Rand und die schmälere, mehr zugespitzte Form des Blattes hinlänglich.

### *Ficus Jynx* Ung.

Unger, Gen. et spec. plant. foss., p. 413. — Die foss. Flora von Sotzka, Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften, Bd. II, p. 163, Taf. 33, Fig. 3. — Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring in Tirol, Abhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt, Bd. II, Abthl. 3, Nr. 2, p. 41, Taf. 10, Fig. 6, 8.

F. foliis longe petiolatis, coriaceis ovato-oblongis vel ellipticis, obtusiusculis vel acutis, integerrimis margine saepe undulatis, penninerviis; nervatione camptodroma, nervis secundariis approximatis e nervo primario crasso sub angulis 70—80° orientibus, marginem versus areuatis et inter se conjunctis. Longt. 3—12 centm., lat. 2—6 centm.

*Rhamnus Eridani* Ung., Gen. et spec. plant. foss., p. 465. — Die fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 178, Taf. 32, Fig. 4—6.

In schisto margaceo ad Sotzka et ad montem Promina, nec non in bituminoso ad Häring.

Eine wie es scheint ausschliesslich der Eocen-Formation angehörige Species, als deren eigentlicher Vegetationsherd die fossile Flora von Sotzka betrachtet werden muss. Hier und aus Häring in Tirol ist sie nur in wenigen Blattfragmenten erhalten worden.

### *Ficus Morloti* Ung.

Unger, die fossile Flora von Sotzka, Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften, Bd. II, p. 164, Taf. 33, Fig. 1.

F. foliis ovatis, circ. 25 centm. longis, 15 centm. latis, petiolatis integerrimis, apice rotundatis, nervatione camptodroma, nervo primario valido, nervis secundariis circ. 3—4 centm. inter se remotis, sub angulis 55—70° orientibus, subsimplicibus, alternis.

In schisto margaceo ad Sotzka Stiriae inferioris et ad montem Promina.

Das Vorkommen dieser interessanten Species erwähnt schon Leopold v. Buch in der Anfangs citirten Schrift über die Lagerung der Braunkohlen in Europa. Durch Herrn Director Schlehan zu Sieverich bekam ich ein Blatt-exemplar derselben, welches dem von Unger a. a. O. abgebildeten an Grösse nur wenig nachgibt.

### Ordo ARTOCARPEAE.

#### **Artocarpidium Ephialtae** Ettingsh.

Taf. VII. Fig. 10.

*A. foliis ovatis, petiolatis, integerrimis, nervatione camptodroma, nervo mediano debili, nervis secundariis tenuibus, approximatis, sub angulis 60—70° orientibus, nervis tertiariis rete laxum macrosynam-malum formantibus.*

In schisto margaceo ad montem Promina.

Ein eiförmiges, gestieltes, ganzrandiges Blatt von anscheinend derber Textur, mit feinen bogenläufigen, unter wenig spitzen Winkeln entspringenden, ziemlich genäherten Secundärnerven, welche ein lockeres, grossmaschiges Netz zwischen sich einschliessen. Die Charaktere und der Habitus dieses Blattes deuten auf eine Verwandtschaft mit den Moreen oder Artocarpeen. Eine Ähnlichkeit dieses Fossils mit manchen Formen des *Ficus Jynae* ist nicht zu verkennen, jedoch ist es von genannter Art durch das grossmaschige Blattnetz sicher zu unterscheiden.

### Ordo NYCTAGINEAE.

#### **Pisonia coccinea** Ettingsh.

Ettingshausen, tert. Flora von Häring in Tirol, Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt, Bd. II, Abthl. 3, Nr. 2, p. 43, Taf. 11, Fig. 1—22.

*P. floribus corymboso cymosis (?); ovario vel achenio elongato, lineari subelavato, laevi, pedicellato, pedicello filiformi; foliis coriaceis, obovatis vel obovato-ellipticis, saepe obliquis, in petiolum 5—10 millm. longum angustatis, apice obtusatis; nervatione dielyodroma, nervo mediano valido, nervis secundariis tenuibus, vix distinctis. Longit. fol. circ. 3—6 centm., lat. 1—2½ centm.*

In schisto catearco-bituminoso ad Häring, in schisto margaceo ad Sotzka et Tüffer Stiriae inferioris, ad Sagor Carniolae nec non ad montem Promina.

Dieselben Blätter, welche ich unter angegebener Bezeichnung in meiner tertiären Flora von Häring a. a. O. beschrieben und in zahlreichen Exemplaren abgebildet habe, fanden sich auch hier vor. Ihre Ähnlichkeit mit Blättern einiger *Pisonia*-Arten ist zwar auffallend, jedoch die wenig charakteristische Form dieser Blätter allein nicht hinreichend, um auf die Vertretung des genannten Geschlechtes in der Flora der Vorwelt mit Sicherheit schliessen zu können. Dies wurde erst durch die Auffindung einer Frucht in den Schichten von Häring möglich. Obige Bestimmung gründet sich vorzüglich auf eine kleine Achene, welche mit den Achenen von *Pisonia subcordata* Swartz aus Brasilien sehr grosse Übereinstimmung zeigt.

### Ordo LAURINEAE.

#### **Daphnogene polymorpha** Ettingsh.

Ettingshausen, Tertiärfloren der österreichischen Monarchie, S. 16, Taf. 2, Fig. 23—25. — Tertiäre Flora von Häring in Tirol, l. c., p. 43, Taf. 31, Fig. 4, 5, 11.

Taf. VI, Fig. 1—8; Taf. VII, Fig. 1—6.

*D. foliis petiolatis, coriaceis e basi aequali saepius angustata lanceolatis vel oblongis, acuminatis vel obtusis, integerrimis, triplinerviis; nervatione acrodroma, nervis secundariis suprabasilaribus, extrorsum ramosis, reliquis minoribus, sub angulo 45° orientibus.*

*Ceanothus polymorphus* A. Braun, Neues Jahrbuch für Mineralogie 1843, S. 171. — Unger, Chloris prot., p. 144, Taf. 49, Fig. 11. — Gen. et spec. plant. foss., p. 446. — Weber, Tertiärfloren der niederrhein. Braunkohlenformation, Palaeontographica von W. Dunker und H. v. Mayer, Bd. II, p. 92, Taf. 6, Fig. 4.

In formatione cœenica ad Häring, Sotzka, Tüffer, Sagor, ad montem Promina; in formatione miocenica ad Radobojum, Fohusdorf, Arufels, Eibiswald, Altsattel, Bilin, Swoszowice, Erlau, Parschlug, Leoben, Wildshuth, Vindobonam, Oeningen, St. Gallen, Mombach, Salzhausen, Bonnam et alibi.

Diese bekannte, von Leopold v. Buch ihrer grossen Verbreitung wegen als tertiäre Leitpflanze hingestellte Form erscheint in den Schichten des Monte Promina noch häufiger als zu Radoboj in Croatien. Es wurde hier zur Darstellung ihrer zahlreichen Abänderungen eine Reihe von Exemplaren abgebildet. Aus der Vergleichung derselben mit den Blättern von *Cinnamomum*, *Camphora*, *Litsaea* und anderen Geschlechtern erhellet wohl mit Evidenz ihre nahe Verwandtschaft zu den Laurineen.

***Daphnogene grandifolia* Ettingsh.**

Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring in Tirol, Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt, Bd. II, Abthl. 3, Nr. 2, p. 45, Taf. 31, Fig. 10.

Taf. VI, Fig. 9—12.

*D. foliis petiolatis coriaceis, rigidis late ovato-oblongis, acutis vel obtusis, integerrimis triplinerviis; nervatione aerodroma, nervis secundariis suprabasilaribus, extrorsum ramosis, nervis tertiariis sub angulo recto vel subrecto exeuntibus. Longi. circ. 10—20 centm., lat. 6—10 centm.*

In schisto margaceo ad Sotzka, Häring et ad montem Promina.

Diese Art erscheint in unserer Flora weit häufiger als in den reichhaltigen Floren von Häring und Sotzka. Da die Blätter sehr gross sind, so fanden sich meist nur Bruchstücke derselben vor, von welchen wir die vollständigsten auf eit. Tafel abbildeten.

***Daphnogene cinnamomifolia* Ung.**

Unger, Gen. et spec. plant. foss., p. 424. — Fossile Flora von Sotzka, Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften, Bd. II, p. 168, Taf. 39, Fig. 7—9. — Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 46, Taf. 31, Fig. 6—9.

Taf. VII, Fig. 8.

*D. foliis coriaceis petiolatis, e basi aequali vel angustata ovalibus vel oblongis, obtusis vel acuminatis, margine integerrimis, triplinerviis; nervatione aerodroma, nervis secundariis suprabasilaribus, nervis tertiariis sub angulo recto vel subrecto exeuntibus, transversis, leviter curvatis.*

In schisto margaceo formationis cœenicae ad Häring et ad montem Promina, in formatione miocenica ad Radobojum, Parschlug, Altsattel, Bonnam, Oeningen etc.

Fand sich nur in einigen wenigen Exemplaren mit den vorhergehenden Formen.

***Daphnogene lanceolata* Ung.**

Unger, Gen. et spec. plant. foss., p. 424. — Fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 167, Taf. 37, Fig. 1—7. — Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 46, Taf. 11, Fig. 23—26.

Taf. VII, Fig. 7.

*D. foliis petiolatis lanceolatis acuminatis, basi producta parum constrictis, integerrimis triplinerviis, nervatione aerodroma, nervis suprabasilaribus subrectis simplicissimis.*

In schisto margaceo formationis cœenicae ad Sotzka et Sagor, in calcareo-margaceo ad montem Promina, nec non in calcareo bituminoso ad Häring.

Nach der hier dargestellten Formenreihe der *Daphnogene polymorpha* dürften sich wohl gegründete Zweifel über die Geltung der *D. lanceolata* Ung. als selbstständige Art erheben. In der That ist die mehr gestreckte Form das einzige Merkmal, auf welches sich die in der Nervation von *D. polymorpha* durchaus nicht verschiedene *D. lanceolata* allenfalls stützt. Will man aber beide Formen als besondere Arten trennen, so kann man die von Unger in der fossilen Flora von Sotzka, l. c. Fig. 1—7, als *D. lanceolata* dargestellten Formen unmöglich zu Einer Art zählen, denn es ist nicht abzusehen, warum z. B. Fig. 5, ja selbst Fig. 1 und 2 an besagtem Orte sich von *D. polymorpha* (*Ceanothus polymorphus* A. Braun) spezifisch unterscheiden sollen. Nur Fig. 3, 4 und 6, durch die lang vorgezogene Spitze und die etwas verschmälerte Basis von der Erstgenannten verschieden, dürften die eigentliche *D. lanceolata* darstellen.

Die von uns auf Taf. VII, Fig. 3—6 abgebildeten Exemplare können immerhin als Übergangsformen zwischen beiden Arten gelten.

***Laurus Lalages* Ung.**

Unger, fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 169, Taf. 40, Fig. 6—9. — Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 47.

*L. foliis ovato-lanceolatis, utrinque attenuatis, longe petiolatis, integerrimis, subcoriaceis, nervatione camptodroma, nervis secundariis simplicibus curvatis, inferioribus approximatis, sub angulo recto vel subrecto, mediis et superioribus sub angulo acutiore orientibus. Longit. foliorum circ. 9—15 centm., lat. 3—3½ centm.*

In schisto margaceo ad Sotzka, Sagor, ad Häring, nec non ad montem Promina.

Fand sich nur in wenigen Exemplaren, zumeist mit Fragmenten von *Goniopteris dalmatica* A. Braun.

***Laurus pachyphylla* Ettingsh.**

Taf. VII, Fig. 9.

*L. foliis ovato-oblongis, integerrimis petiolatis, basi obtusis, coriaceis rigidis; nervatione camptodroma, nervis secundariis validis subsimplicibus rectis, sub angulo acuto orientibus. Longt. circ. 7 centm., lat. 2½ centm.*

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Vorliegendes Blatt zeigt die Form der *Laurus Swosowicziana* Ung. und beiläufig die Nervatur der vorhergehenden Species. Von beiden muss es aber seiner auffallenden derblederartigen Beschaffenheit und der stark hervortretenden Secundärnerven wegen der Art nach getrennt werden.

## Ordo SANTALACEAE.

***Santalum acheronticum* Ettingsh.**

Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 49, Taf. 12, Fig. 6—10.

*S. foliis ovatis vel ovato-oblongis, obtusis, integerrimis, petiolatis, basi acutis, 22—34 millm. longis, 8—12 millm. latis, subcoriaceis; nervatione dictyodroma, nervo medio distincto, nervis secundariis simplicibus, sparsis, vix conspicuis.*

*Vaccinium acheronticum* Ung. (ex parte), Gen. et spec. plant. foss., p. 440. — Fossile Flora von Sotzka, Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften, Bd. II, Taf. 43, Fig. 2, 8, 9, 12, 14, 17.

In schisto margaceo formationis eocenicae ad Sotzka, ad Sagor, ad Häring, nec non ad montem Promina; in formatione mioecenica ad Parschlug, ad Radoboj, nec non ad Erdöbénye prope Tokay.

***Santalum salicinum* Ettingsh.**

Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 49, Taf. 12, Fig. 3—5.

*S. foliis subcoriaceis, 4—6 centm. longis, circ. 1 centm. latis, oblongo-lanceolatis, integerrimis, obtusis, basi in petiolum crassum angustatis; nervatione dictyodroma, nervo medio distincto, saepe infra apicem evanescente, nervis secundariis vix conspicuis.*

In schisto calcareo-bituminoso ad Häring, in calcareo-margaceo ad Sagor, Sotzka, nec non ad montem Promina.

***Santalum osyrium* Ettingsh.**

Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 49, Taf. 12, Fig. 14—18.

Taf. IX, Fig. 3.

*S. foliis lanceolatis acutis margine integerrimis, basi in petiolum brevem angustatis, coriaceis, 26—40 millm. longis, 7—10 millm. latis; nervatione hyphodroma, nervo medio distincto.*

In schisto margaceo ad Sotzka Stiriae, ad montem Promina, nec non in calcareo bituminoso ad Häring.



## Ordo PROTEACEAE.

***Petrophiloides Richardsoni.***

Ettingshausen, die Proteaceen der Vorwelt, Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, Bd. VII, 1851, p. 712.

*P. strobilis ovoideis vel cylindricis*  $1\frac{1}{2}$ —4 centm. in diametro longitudinali, 1—3 centm. in diametro transversali metuentibus, squamis confluentibus, apicibus subgibbosis vel depressis; seminibus compressis ovatis, obtusis, bilobis.

*Petrophiloides Richardsoni* Bowerb., Hist. of the foss. fruits and seeds of the London-clay, I, p. 44, Taf. 9, Fig. 9—15; Taf. 10, Fig. 5—8.

*Petrophiloides cylindricus* Bowerb., l. c. p. 48, Taf. 9, Fig. 18, 19.

*Petrophiloides conoideus* Bowerb., l. c. p. 48, Taf. 9, Fig. 26.

*Petrophiloides ellipticus* Bowerb., l. c. p. 49, Taf. 9, Fig. 21.

*Petrophiloides cellularis* Bowerb., l. c. p. 47, Taf. 9, Fig. 16, 17.

In argilla londinensi ad littora Swale Cliff et Herne-Bay insulae Sheppy, nec non in calcareo-margaceo ad montem Promina Dalmatiae.

***Banksia longifolia* Ettingsh.**

Ettingshausen, Proteaceen der Vorwelt, Sitzungsberichte, l. c. p. 730, Taf. 31, Fig. 19. — Tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 53, Taf. 15, Fig. 11—26.

Taf. VII, Fig. 12—14; Taf. VIII.

*B. foliis anguste linearibus*, basi in petiolum attenuatis, margine remote denticulatis; nervatione dictyodroma, nervo primario distincto, nervis secundariis tenuissimis, sub angulo recto orientibus, reticulatis.

*Myrica longifolia* Ung., Gen. et spec. plant. foss., p. 396. — Foss. Flora v. Sotzka, Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften, Bd. II, S. 159, Taf. 27, Fig. 2; Taf. 28, Fig. 1.

*Myrica Ophir* Ung., Gen. et spec. plant. foss., p. 396. — Fossile Flora von Sotzka, l. c. Taf. 27, Fig. 12—16.

In schisto margaceo formationis eocenicae ad Sagor, Sotzka, Häring et ad montem Promina, in formatione miocenica ad Fohnsdorf Stiriae superioris, nec non ad Blocksberg prope Budam.

***Banksia haeringiana* Ettingsh.**

Ettingshausen, Proteaceen der Vorwelt, l. c. p. 731, Taf. 31, Fig. 17, 18. — Tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 54, Taf. 16, Fig. 1—23.

Taf. VII, Fig. 16.

*B. foliis lanceolatis vel lineari-lanceolatis*, subcoriaceis, basi in petiolum attenuatis, margine argute serrato-denticulatis; nervatione dictyodroma, nervo primario distincto, nervis secundariis tenuissimis sub angulis  $65$ — $80^{\circ}$  orientibus, arcuatis, marginem versus adscendentibus.

*Myrica haeringiana* Ung., Gen. et spec. plant. foss., p. 395. — Foss. Flora v. Sotzka, l. c. p. 160, Taf. 27, Fig. 11; Taf. 28, Fig. 8.

In schisto margaceo formationis eocenicae ad Sotzka, ad Sagor, ad Häring, nec non ad montem Promina.

***Banksia Ungerii* Ettingsh.**

Ettingshausen, Proteaceen der Vorwelt, l. c. p. 731. — Tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 54, Taf. 17, Fig. 1—22; Taf. 18, Fig. 1—6.

*B. foliis lineari-lanceolatis vel linearibus*, coriaceis, in petiolum attenuatis, margine argute serrato-crenatis; nervatione dictyodroma, nervo primario distincto, nervis secundariis numerosis, tenuissimis, approximatis, sub angulo recto vel subrecto orientibus.

*Phyllites ambiguus* Sternb., Vers. 1, Fasc. 4, Taf. 42, Fig. 1.

*Myrica banksiaefolia* Ung., Gen. et spec. plant. foss., p. 395. — Fossile Flora von Sotzka, Denkschriften der kais. Akad. der Wissenschaften, Bd. II, p. 160, Taf. 27, Fig. 3, 4.

*Myrica speciosa* Ung., Gen. et spec. plant. foss., p. 396. — Fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 161, Taf. 28, Fig. 7.

In schisto margaceo formationis eocenicae ad Sotzka, ad Sagor, ad Häring, nec non ad montem Promina.



***Banksia dillenoides* Ettingsh.**

Ettingshausen, Proteaceen der Vorwelt, l. c. p. 732. — Tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 55, Taf. 18, Fig. 7.

Taf. IX, Fig. 5—9.

B. foliis oblongo-lanceolatis, coriaceis, basi in petiolum angustatis, margine serrato-crenatis; nervatione dictyodroma, nervo primario valido, nervis secundariis tenuibus, 2—5 millm. distantibus, sub angulo subrecto orientibus.

In schisto calcareo-bituminoso ad Häring, in calcareo-margaceo ad montem Promina.

***Dryandra Brongniartii* Ettingsh.**

Ettingshausen, Proteaceen der Vorwelt, l. c. p. 734, Taf. 32, Fig. 1—8. — Tertiäre Flora von Häring in Tirol, l. c. p. 55, Taf. 19, Fig. 1—26.

Taf. XIV, Fig. 5—6.

D. foliis linearibus vel lineari-lanceolatis, acuminatis, coriaceis, basi in petiolum angustatis, alternatim pinnatifidis, laciniis triangularibus, vel subrhombeis, acutiusculis, 2—4 nerviis; nervatione dictyodroma, nervis tenuissimis, sub angulis 65—80° orientibus.

*Comptonia dryandraefolia* Brongn., Prodr. p. 143, 214. — Ann. des sciences, natur. Tom. IV, p. 49, Taf. 3, Fig. 7. — Unger, Gen. et spec. plant. foss., p. 393.

*Comptonia brevifolia* Brongn., Transact. of Geol. Soc. Vol. VII, p. 373. — Unger, Gen. et spec. plant. foss., p. 394. — Fossile Flora von Sotzka, Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften, Bd. II, p. 162, Taf. 29, Fig. 2.

*Aspleniopteris Schrankii* Sternb., Vers. I, Fase. 4, p. 22, Taf. 24, Fig. 2.

In formatione tertiaria ad Eperies Hungariae, ad Häring Tirolis, ad montem Promina Dalmatiae, ad Armissan prope Narbonne, ad montem Gergovia prope Clermont Galliae, nec non in pluribus locis Helvetiae.

***Dryandroides hakeaefolia* Ung.**

Unger, Gen. et spec. plant. foss., p. 428. — Fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 169, Taf. 27, Fig. 5, 8, 10; Taf. 44, Fig. 7—10. — Ettingshausen, Proteaceen der Vorwelt, l. c. p. 738. — Tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 56, Taf. 20, Fig. 1, 2.

Taf. VII, Fig. 15.

D. foliis elongato-lanceolatis, in petiolum attenuatis, remote dentatis, coriaceis, dentibus parvis inaequalibus, nervatione hyphodroma, nervo primario distincto.

In schisto margaceo formationis eocenicae ad Sotzka, Häring et ad montem Promina.

**Ordo APOCYNACEAE.*****Apocynophyllum plumeriaefolium* Ettingsh.**

Taf. IX, Fig. 14.

A. foliis oblongis breviter petiolatis, integerrimis versus basin angustatis; nervatione campodroma, nervis secundariis validis, approximatis, e nervo primario valido sub angulis 70—85° orientibus, simplicibus. Longt. circ. 7 centm., lat. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> centm.

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Dieses Blatt ist seiner charakteristischen Nervation wegen nicht schwierig zu deuten. Aus dem starken Primärnerven entspringen bogenläufige, ziemlich stark ausgeprägte Secundärnerven unter wenig spitzem oder nahe rechtem Winkel. Dieselben sind genähert, einfach, zeigen einen schwach welligen Verlauf und bilden erst in der Nähe des Blattrandes einen kleinen Bogen. Zwischen den Secundärnerven liegt ein lockeres Netz, welches jedoch nur an wenigen Stellen erhalten ist und dessen Nerven erster Ordnung aus den secundären Nerven unter rechtem Winkel entspringen. Die länglich-verkehrt-ovale, ganzrandige Form und die ziemlich derbe Textur des Blattes in Combination mit der beschriebenen Nervation finden wir beinahe ausschliesslich und in zahlreichen Fällen in der Ordnung der Apocynaceen, wo Blätter von Plumeria-, Allamanda- und andere Arten sehr grosse Übereinstimmung darbieten.

## Ordo SAPOTACEAE.

***Bumelia oblongifolia* Ettingsh.**

Taf. IX, Fig. 2.

*B. foliis coriaceis, breviter petiolatis, cuneiformibus, integerrimis, apice rotundatis; nervatione dictyodroma, nervo primario valido, nervis secundariis tenuibus sub angulo acuto orientibus. Longt. circ. 5—6 centm., lat. 2 centm.*

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Unterscheidet sich von den Blättern der nachfolgenden Art durch die länglich-keilige Form und die angegebene Nervation, von der ihr noch näher stehenden *Bumelia ambigua* durch die derbere Blattform und die unter minder spitzen Winkeln abgehenden Secundärnerven.

***Bumelia Oreadum* Ung.**

Unger, Gen. et spec. plant. foss., p. 435. — Fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 172, Taf. 43, Fig. 7—14. — Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 64, Taf. 21, Fig. 19, 20.

*B. foliis obovatis, obtusis, petiolatis, integerrimis, coriaceis; nervatione dictyodroma, nervis secundariis tenuissimis.*

In schisto margaceo formationis eocenicae ad Sotzka, Sagor et ad montem Promina, nec non in calcareo-bituminoso ad Häring; in formatione miocenica ad Radobojum, Fohndorf, ad Bonnam.

***Sapotacites Daphnes* Ettingsh.**

Taf. IX, Fig. 10.

*S. foliis petiolatis ovato-oblongis vel oblongo-lanceolatis, margine saepe revoluti-integerrimis, coriaceis, rigidis, supra nitidis; nervatione dictyodroma, nervis secundariis tenuissimis, approximatis, rectis parallelisque, e nervo primario valido sub angulis 65—80° orientibus. Longt. circ. 5—9 centm., lat. 1½—3 centm.*

*Quercus Daphnes* Ung., Chlor. protog., Taf. 31, Fig. 2, 3. — Gen. et spec. plant. foss., p. 402.

In schisto calcareo-margaceo formationis eocenicae ad montem Promina, in margaceo formationis miocenicae ad Parschlug Stiriae, nec non ad Schemnitz Hungariae.

***Sapotacites vaccinioides* Ettingsh.**

Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 63, Taf. 21, Fig. 10—16.

*S. foliis obovatis, brevissime petiolatis vel sessilibus, integerrimis, coriaceis, apice obtuso saepius emarginatis, nervatione hypodroma, nervo mediano solo conspicuo. Longt. 1½—2½ centm., lat. 4—7 millm.*

In schisto calcareo-bituminoso ad Häring, in margaceo ad Sotzka, nec non ad montem Promina.

***Sapotacites ambiguus* Ettingsh.**

Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 63, Taf. 21, Fig. 25.

Taf. IX, Fig. 4.

*S. foliis lanceolatis vel oblongis, petiolatis, integerrimis, coriaceis, rigidis, basi et apice acutis, nervatione hypodroma, nervo mediano solo conspicuo. Longt. 3 centm., lat. 9 millm.*

In schisto calcareo-bituminoso ad Häring, in margaceo ad Sotzka, nec non ad montem Promina.

## Ordo ERICACEAE.

***Andromeda prologaea* Ung.**

Unger, fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 173, Taf. 64, Fig. 1—9. — Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 64, Taf. 22, Fig. 1—8.

Taf. IX, Fig. 11.

*A. foliis lineari-lanceolatis, elongatis, longe petiolatis, obtusiusculis, integerrimis, coriaceis, nervatione hypodroma, nervo medio solo conspicuo. Longt. circ. 4—10 centm., lat. 1—2 centm.*

In formatione eocenica ad Sotzka, Sagor, ad montem Promina, nec non ad Häring; in formatione miocenica ad Heiligenkreuz prope Kremnitz, ad Szakadat Transsylvanicae, nec non ad Wittingau Bohemiae.

***Gautiera eocenica* Ettingsh.**

Taf. IX, Fig. 12.

*G. foliis coriaceis, ovato-lanceolatis, basi angustatis, integerrimis, nervatione camptodroma, nervo primario valido, nervis secundariis sub angulis 20—30° orientibus. Longt. circ. 7—8 centm., lat. 1 $\frac{1}{2}$ —2 centm.*

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Dieses Blatt verräth weniger seiner Form als der Nervation und der auffallend derben lederartigen Textur nach eine nicht geringe Ähnlichkeit mit der von O. Weber beschriebenen *Gautiera lignitum* aus den Braunkohlengebilden des niederrheinischen Tertiärbeckens. Auch die nordamerikanische *Gautiera acuminata* Schlecht., welche Weber mit der genannten fossilen Art vergleicht, stimmt besonders in der Nervation mit demselben überein. Ich stellte es aus diesem Grunde unter das bezeichnete Geschlecht und unterscheidet die Art, welcher dieses Blatt angehörte, von der Weber'schen durch die lanzettliche, an der Basis verschmälerte Form und die unter spitzen Winkeln abgehenden Secundärnerven.

***Vaccinium acheronticum* Ung.**

Unger, Gen. et spec. plant. foss., p. 440. — Fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 173. Taf. 45, Fig. 1, 3, 4, 16.

*V. foliis ovato-lanceolatis, obtusis, integerrimis, petiolatis, subcoriaceis; nervatione dictyodroma, nervo primario distincto, nervis secundariis subtilibus ramosisque. Longt. circ. 2—4 centm., lat. 5—12 millm.*

In formatione eocenica ad Sotzka et ad montem Promina, in mioenica ad Parschlug et Radoboj.

***Rhododendron Saturni* Ettingsh.**

Taf. IX, Fig. 1.

*R. foliis lanceolatis basi rotundata sessilibus, integerrimis, coriaceis; nervatione dictyodroma, nervo primario valido, nervis secundariis tenuibus, apice ramosis. Longt. circ. 6—7 centm., lat. 2 centm.*

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Ein starres, lederartiges, sitzendes Blatt von lanzettlicher Form mit hervortretendem Median- und feinen ästigen unter wenig spitzen Winkeln abgehenden Secundärnerven. Blätter von Ericaceen, namentlich mehrerer Rhododendron-Arten, z. B. von *R. punctatum* Beh. aus Nordamerika, zeigen mit demselben besonders dem Typus der Nervation nach grosse Ähnlichkeit.

## Ordo NELUMBONAE.

***Nelumbium Buchii* Ettingsh.**

Taf. X, Fig. 2, 3; Taf. XI, Fig. 1; Taf. XII.

*N. foliis longe petiolatis, laminis natantibus, orbicularibus, peltatum petiolo crasso insertis, integerrimis, coriaceis; nervatione aspidodroma, nervis crassis, striatis, ramosis; ramis sub angulis acutissimis orientibus dichotomis.*

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Diese interessanten Pflanzenreste bezeugen sich unzweifelhaft als Blatttheile einer *Nelumbium*-Art. Die höchst wahrscheinlich sehr lang gestielten Blätter zeigen einen kreisrunden, vollkommen ganzrandigen Laminartheil von ziemlich derber, lederartiger Consistenz, der schildförmig und excentrisch einem dicken Stiele eingefügt ist. Die schildläufigen, von der ansehnlichen und etwas hervorragenden Einfügungsstelle des Stieles strahlenförmig auslaufenden Nerven sind mächtig hervortretend, steif, an der Spitze ästig; ihre Äste unter sehr spitzen Winkeln entspringend, fast parallel laufend, gabelspaltig. Mit der eben charakterisirten Form und Nervation stimmen die Blätter des die Süßwasseransammlungen des wärmeren Asiens zierenden *Nelumbium speciosum* Willd. ziemlich überein. Entfernter stehen die Blattformen des nordamerikanischen *N. luteum* Willd.

***Nelumbium nymphaeoides* Ettingsh.**

Taf. X, Fig. 1; Taf. XI, Fig. 2.

*N.* foliis longe petiolatis, subpeltatis basi sagittaeformibus, integerrimis, lobis obtusis, approximatis, subconniventibus; nervatione aspidodroma, nervis crassis, strictis, ramosis.

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Unterscheidet sich von der vorhergehenden Art, welcher sie in der Nervation vollkommen gleicht, durch den spitzen, pfeilförmige Lappen bildenden Einschnitt an der Einfügungsstelle der Lamina.

## Ordo BUETTNERIACEAE.

***Dombeyopsis Philyrae* Ettingsh.**

Taf. IX, Fig. 13—16.

*D.* foliis rotundatis, integerrimis, coriaceis, nervatione camptodroma, nervis secundariis validis, arcuatis, suboppositis, superioribus simplicibus, vel apice ramosis, inferioribus et infimis extrorsum pinnatis. Longt. circ. 6 centm., lat. 3 centm.

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Von der im Typus der Nervation übereinstimmenden *Dombeyopsis tiliacfolia* Ung. durch die gleiche, nicht herzförmig ausgeschnittene Basis und die derbe, lederartige Blatt-Consistenz wohl verschieden.

***Dombeyopsis grandifolia* Ung.**

Unger, Gen. et spec. plant. foss., p. 447. — Fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 173, Taf. 47, Fig. 1—2; Taf. 48, Fig. 1—2. Ettingshausen, fossile Flora von Willdshuth, Sitzungs- u. d. kais. Akad. d. Wissensch. IX. Bd. p. 40, Taf. 4, Fig. 1—2.

*D.* foliis dimidiato-ordatis, subpeltatis, integerrimis, magnis nervatione actinodroma, nervis 5—7, lateralibus extrorsum, mediano utrinque pinnato, venis intersicialibus rete laxum ex areolis pentagonalibus hexagonalibusque formantibus.

In schisto margaceo formationis eocenicae ad montem Promina, in formatione mioecica ad Prevali Carinthiae, ad Bilinum Boemiae, ad Leoben et Kainberg Stiriae, ad Willdshuth Austriae superioris, nec non ad Bonnam.

## Ordo STERCULIACEAE.

***Sterculia Labrusca* Ung.**

Unger, fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 173, Taf. 49, Fig. 1—11.

Taf. XIV, Fig. 7.

*S.* foliis longe petiolatis, coriaceis, basi rotundatis vel subcordatis, trilobis, rarius bi- vel quinquelobis, lobis lanceolatis, acuminatis, integerrimis, lobo medio saepius productiore; nervatione actinodroma, nervis 2—3, nervis secundariis tenuissimis, simplicibus.

*Laurus Labrusca* Ung., Gen. et spec. plant. foss., p. 423.

*Ficus caricoides* Ung., fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 163, Taf. 34, Fig. 8.

*Platanus Sirii* Ung., fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 166, Taf. 36, Fig. 1.

*Acer sotzkianum* Ung., (ex parte), fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 173, Taf. 50, Fig. 1—3.

In schisto margaceo formationis eocenicae ad Sotzka, Sagor, nec non ad montem Promina.

Von dieser vielgestaltigen Form, welche wir aus den Mergeln von Sotzka in zwei-, drei- und fünfflappigen Typen kennen gelernt haben, fanden sich hier nur wenige Exemplare. Das auf der angegebenen Tafel abgebildete stellt eine Mittelform zwischen den von Unger als *Acer sotzkianum* und *Sterculia Labrusca* bezeichneten Blättern dar. Zahlreiche Übergangsformen zwischen diesen beiden, *Ficus caricoides* und *Platanus Sirii*, fanden sich zu Sotzka in Untersteiermark.



## Ordo MALPIGHIACEAE.

***Malpighiastrum dalmaticum*** Ettingsh.

Taf. XIII, Fig. 1.

*M. foliis late lanceolatis, basin versus angustatis, integerrimis, coriaceis, nervatione camptodroma, nervis secundariis 10—15 millm. distantibus, sub angulis 60—70° orientibus simplicibus vel apice ramosis.*

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Dieses Blattfragment scheint der Form und Nervation nach, die es verräth, einer Malpighiacee anzugehören. Es konnte weder mit einer der bis jetzt beschriebenen fossilen Formen der genannten Ordnung vereint, noch seiner unvollständigen Erhaltung wegen irgend einem der zahlreichen Geschlechter derselben mit Sicherheit eingereiht werden. Wir stellen es daher vorläufig unter das obige von Unger gebildete Hilfs-Genus.

## Ordo CELASTRINEAE.

***Celastrus Phlegethontis*** Ettingsh.

Taf. IX, Fig. 13.

*C. foliis coriaceis, ovatis, acuminatis, basi obtusis, margine denticulatis; nervatione dielyodroma, nervo mediano distincto, nervis secundariis tenuibus, sub angulo acuto egredientibus in rete laxum solutis. Longt. circ. 3 cent., lat. 2 centm.*

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Ein eiförmiges, an der Spitze verschmälertes, an der Basis stumpfes, am Rande gezähneltes Blatt von lederartiger Textur, mit hervortretendem, bis zur Spitze verlaufendem Median-, und netzläufigen, ziemlich feinen Secundärnerven. Seiner ganzen Tracht nach scheint dasselbe der Ordnung der Celastrineen anzugehören. Unter den bis jetzt bekannten fossilen Blattformen dieser Ordnung gleicht es am meisten dem *Celastrus europaeus* Ung.

***Celastrus Andromedae*** Ung.

Unger, Gen. et spec. plant. foss., p. 439. — Fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 177, Taf. 51, Fig. 2—10.

Taf. XIV, Fig. 8.

*C. foliis ovatis vel lanceolatis, utrinque attenuatis, petiolatis, dentato-crenatis, coriaceis; nervatione dielyodroma, nervis secundariis tenuissimis, apice ramosis, sub angulis acutis variis orientibus. Longt. circ. 4—6 centm., lat. 1—2 centm.*

In schisto margaceo ad Sotzka et ad montem Promina.

***Celastrus orcophilus*** Ung.

Unger, fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 177, Taf. 51, Fig. 11—13. — Ettingshausen, tert. Flora von Häring, l. c. p. 72, Taf. 23, Fig. 1.

Taf. IX, Fig. 17.

*C. foliis parvis obovatis, in petiolum attenuatis, coriaceis, integerrimis; nervatione hyphodroma, nervo mediano crasso. Longt. circ. 2—3 centm., lat. 1½—2 centm.*

In schisto calcareo-margaceo ad Sotzka, ad montem Promina, nec non in bituminoso ad Häring.

## Ordo RHAMNEAE.

***Rhamnus Roosteri*** Ettingsh.

Taf. XIII, Fig. 2, 3.

*R. foliis lanceolatis vel lineari-lanceolatis, integerrimis, longe petiolatis, subcoriaceis; nervatione camptodroma, nervis secundariis e nervo primario excurrente sub angulis 40—50° orientibus, 3—6 millm. distantibus, simplicibus, parallelis.*

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.



Diese Blätter zeigen in ihren Charakteren so viele Ähnlichkeit mit den Blättern mehrerer Rhamneen-Arten, namentlich aus den Geschlechtern Rhamnus und Pomaderris, dass die nahe Verwandtschaft dieser zu jenen kaum bezweifelt werden kann. Die Art, welche zu den Seltenheiten unserer Flora gehört, unterscheidet sich von den bis jetzt entdeckten vorweltlichen Rhamneen mit bogenlängiger Nervation durch die lanzettliche Form, den über 1 Centn. langen Blattstiel und die derbe lederartige Textur hinlänglich. Ich benenne dieselbe zu Ehren des Herrn G. Rösler, durch dessen gütige Mittheilung ich zur Kenntniss derselben gelangte.

***Ceanothus zizyphoides* Ung.**

Unger, Chloris protog., p. 143, Taf. 49, Fig. 10. — Gen. et spec. plant. foss., p. 466. — Fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 179, Taf. 32, Fig. 8, 9. — Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 76, Taf. 23, Fig. 9—39.

Taf. IX, Fig. 18, 19.

C. ramulis elongatis, foliis alternis petiolatis, lanceolato-acuminatis, vel ovato-lanceolatis vel ovalis, basi saepius obliquis, abortu subrotundis, margine remote dentatis vel denticulatis, triplinervis; nervatione aerodroma, nervis secundariis infimis subbasilaribus, simplicibus, nervis reliquis tenuissimis, ramosissimis. Longt. norm. circ. 2—8 centm., lat. 6—23 millm.

In formatione eocenica ad Häring, Sotzka, nec non ad montem Promina.

Von dieser in den Tertiärschichten von Häring und Sotzka sehr häufigen Art fanden sich hier nur die zwei abgebildeten Blätter. Über die Richtigkeit der Bestimmung kann bei der charakteristischen Form dieser Rhamneen-Blätter kein Zweifel entstehen.

Ordo MYRTACEAE.

***Callistemophyllum melaleucacforme* Ettingsh.**

Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring in Tirol, l. c. p. 84, Taf. 27, Fig. 13, 14.

Taf. XIV, Fig. 10.

C. foliis lanceolato-linearibus, petiolatis, integerrimis, coriaceis; nervatione dictyodroma, nervis secundariis crebris, tenuibus, e nervo primario distincto sub angulis acutis orientibus, simplicibus vel ramosis. Longt. 6—7 centm., lat. 7—9 millm.

In schisto margaceo ad Sotzka, Sagor et ad montem Promina, nec non in calcareo-bituminoso ad Häring.

***Callistemophyllum diosmoides* Ettingsh.**

Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring in Tirol, l. c. p. 83, Taf. 27, Fig. 6—9.

C. foliis lineari-lanceolatis vel linearibus, petiolatis, integerrimis, coriaceis; nervatione dictyodroma, nervo mediano tenui, nervis secundariis vix conspicuis, in rete tenerrimo solutis. Longt. 2—3½ centm., lat. 3—4 millm.

In formatione eocenica ad Sotzka, ad Häring et ad montem Promina.

***Eucalyptus oceanica* Ung.**

Unger, fossile Flora von Sotzka, Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften, Bd. II, p. 182, Taf. 37, Fig. 1—13. — Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 84, Taf. 28, Fig. 1.

Taf. XIII, Fig. 8—13; Taf. XIV, Fig. 9.

E. foliis 2—3 pollicaribus, lanceolatis vel lineari-lanceolatis, acuminatis subfalcatis, in petiolum attenuatis, coriaceis, integerrimis, petiolis semipollicaribus, saepius basi contortis; nervatione dictyodroma, nervo primario distincto, nervis secundariis tenuissimis, sub angulis acutis orientibus.

In schisto margaceo ad Sotzka, Sagor et ad montem Promina, nec non in calcareo-bituminoso ad Häring.

**Eugenia Apollinis** Ung.

Unger, Gen. et spec. plant. foss., p. 480. — Fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 182, Taf. 56, Fig. 3—18. — Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring in Tirol, l. c. p. 85, Taf. 27, Fig. 20, 21.

*E. foliis petiolatis, lanceolatis vel ovatis, obtusiusculis, integerrimis, coriaceis; nervatione dictyodroma, nervo mediano excurrente, nervis secundariis tenuissimis, approximatis, sub angulo acuto orientibus. Longt. 2—6 centm., lat.  $1\frac{1}{2}$ —3 centm.*

In schisto margaceo formationis eocenicae ad Sotzka, Sagor, ad montem Promina, nec non in calcareo-bituminoso ad Häring.

## Ordo PAPILIONACEAE.

**Dalbergia primaeva** Ung.

Unger, fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 185, Taf. 60, Fig. 8—12. — Ettingshausen, Tert. Flora v. Häring, l. c. p. 96. Taf. XIII, Fig. 5.

*D. foliis pinnatis, foliolis petiolatis ovato-lanceolatis, acuminatis, integerrimis, ultrapollicaribus.*

In formatione eocenica ad Sotzka, ad Sagor, ad Häring (?), et ad montem Promina.

**Sophora europaea** Ung.

Unger, Gen. et spec. plant. foss., p. 490. — Fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 187, Taf. 63, Fig. 1—5. — Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 89, Taf. 29, Fig. 20. — Beitrag zur Kenntniss der fossilen Flora von Tokay, Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, Bd. XI. p. 813, Taf. 4, Fig. 4.

Taf. XIII, Fig. 4.

*S. foliis impari-pinnatis, plurijugis; foliolis rotundato-obovatis vel ellipticis, basi inaequalibus, breviter petiolatis, integerrimis; nervo primario valido, nervis secundariis inconspicuis. Foliol. long. circ.  $2\frac{1}{2}$ —3 centm., lat.  $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$  centm.*

In formatione eocenica ad Sotzka, ad Sagor, Häring et ad montem Promina; in formatione miocenica ad Radoboj et ad Erdöbénye prope Tokay.

**Caesalpinia norica** Ung.

Unger, fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 187, Taf. 63, Fig. 8, 9. — Ettingshausen, Tertiäre Flora von Häring in Tirol, l. c. p. 96.

*C. foliis abrupte bipinnatis, partialibus quadrijugis, propriis sexjugis; foliolis inaequalibus, basi inaequali ovato-ellipticis, semipollicaribus, emarginatis, integerrimis, subsessilibus.*

In formatione eocenica ad Sotzka, ad montem Boica prope Verona et ad montem Promina Dalmatiae, nec non ad Häring Tirolis.

**Caesalpinia Haidingeri** Ettingsh.

Ettingshausen, Tertiäre Flora von Häring in Tirol, l. c. p. 89, Taf. 29, Fig. 21—39.

*C. foliis bipinnatis, foliolis inaequalibus, ellipticis vel subrotundis, basi obliquis, brevissime petiolatis, integerrimis, nervo primario distincto, nervis secundariis inconspicuis. Foliol. longt. circ. 7—19 millm., lat. 3—11 millm.*

In schisto calcareo-bituminoso ad Häring frequens; nec non in calcareo-margaceo ad montem Promina.

**Cassia ambigua** Ung.

Unger, Gen. et spec. plant. foss., p. 492. — Ettingshausen, Tertiärfloren der österr. Monarchie; fossile Flora von Wien, p. 27, Taf. 5, Fig. 9—13. — Tertiäre Flora von Häring in Tirol, l. c. p. 90, Taf. 29, Fig. 43—46.

Taf. XIII, Fig. 6.

*C. foliis pinnatis, foliolis subsessilibus v. breviter petiolatis, oblongo-ellipticis v. lanceolatis, subcoriaceis, integerrimis, obtusiusculis v. acutis, basi rotundata inaequalibus; nervatione dictyodroma, nervo primario distincto, nervis secundariis tenuissimis. Foliol. longt. circ.  $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$  centm., lat. 6—10 millm.*

In calcareo-bituminoso formationis eocenicae ad Häring, in calcareo-margaceo ad montem Promina; in formatione miocenica ad Parschlug et Fohndorf Stiriae, ad Bilin, Vindobonam, Radoboj, ad Erdöbénye prope Tokay, nec non ad Oeningen.

***Cassia Zephyri* Ettingsh.**

Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 90, Taf. 30, Fig. 1—8.

Taf. XIII, Fig. 16.

*C. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, integerrimis, subcoriaceis, basi acuta subobliquis; nervo primario valido, nervis secundariis obsoletis. Foliol. longt. circ.  $2\frac{1}{2}$ —4 centm., lat. 7—11 millm.*

In schisto calcareo-bituminoso ad Häring, in margaceo ad montem Promina.

***Cassia hyperborea* Ung.**

Unger, Gen. et spec. plant. foss., p. 492. — Fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 188, Taf. 64, Fig. 1—3. — Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 91, Taf. 30, Fig. 12—14.

Taf. XIII, Fig. 18—23.

*C. foliis pinnatis, foliolis petiolatis ovato-lanceolatis, acuminatis, integerrimis, subcoriaceis, basi inaequalibus, nervo primario valido, nervis secundariis subtilibus, vix conspicuis. Foliol. longt. circ.  $4\frac{1}{2}$ —9 centm., lat. 2—3 centm.*

*Cassia Berenices* Ung., fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 188, Taf. 64, Fig. 4—10.

In formatione eocenica ad Sotzka, Sagor ad Häring et ad montem Promina; in formatione mioenica ad Parschlug, Radoboj et Bonum.

***Cassia Diones* Ettingsh.**

Taf. XIII, Fig. 7.

*C. foliis pinnatis, foliolis multijugis, ovatis, integerrimis, acuminatis, coriaceis, basi subobliquis, breviter petiolatis, petiolo transversim rugoso; nervo primario valido, excurrente.*

In schisto calcareo-margaceo ad montem Promina.

Dieses Fiederblättchen unterscheidet sich von denen der *Cassia hyperborea* nur durch den kurzen, querrunzeligen Stiel und die fast gleiche Basis.

***Cassia Phaseolites* Ung.**

Unger, fossile Flora von Sotzka, l. c. p. 188, Taf. 63, Fig. 1—5; Taf. 66, Fig. 1—9. — Ettingshausen, tertiäre Flora von Häring, l. c. p. 91, Taf. 30, Fig. 15—17.

*C. foliis pinnatis, foliolis multijugis, petiolatis, ovato-elongatis, obtusiusculis, basi rotundata obliquis, integerrimis, membranaceis, nervo primario valido, nervis secundariis tenuibus, crebris, subsimplicibus, parallelis. Longt. foliol. circ. 7—10 centm., lat. 2—4 centm.*

*Phaseolites cassiaefolia* Ung., Gen. et spec. plant. foss., p. 488.

In schisto margaceo formationis eocenicae ad Sotzka, ad montem Promina et ad Häring; formationis mioenicae ad Radobojum.

## Erklärung der Tafeln.

### Tafel I.

- Fig. 1. *Delesserites sphacrococcoides* Ettingsh.; *a.* ein Fragment des gabelspaltigen Laubes, schwach vergrößert, um die eigenthümliche fiederige Nervation desselben darzustellen. Das einzige Exemplar dieser Art, welches sich am Monte Promina vorfand.
- Fig. 2, 3. *Sphacrococcites flabelliformis* Ettingsh.; Fig. 2 stellt ein Fragment eines jüngeren, minder entwickelten Laubes Fig. 3 eines älteren Laubes dar, an welchen man die derbe lederartige Textur recht deutlich erkennen kann.
- Fig. 4, 5. *Chondrites dalmatiens* Ettingsh.; Fig. 4 den oberen Theil eines Laubzweiges mit dünneren, aufrechten Ästchen, Fig. 5 den unteren Theil eines solchen mit steiferen, wagrecht abstehenden Ästchen darstellend.
- Fig. 6, 7. *Equisetites Erbreichii* A. Braun; Fig. 6 mittlerer Theil des Stengels mit Fragmenten der quirlig gestellten Äste und einer wohl erhaltenen, die Gliederung desselben zierenden Scheide; Fig. 7 unterer Theil des Equiseten-Stengels mit genäherten Gliedern und stärkeren Längsstreifen.
- Fig. 8, 9. *Goniopteris dalmatica* A. Braun; Fig. 8 mittlerer Theil eines jüngeren Wedels, an welchem man die Stellung der theilweise wohl erhaltenen Fiedern noch entnehmen kann, Fig. 9 die zusammengehörigen und mehr gedrängten Seitenfiedern eines stärkeren Wedels darstellend; Fig. *b* Theil einer Fieder in schwacher Vergrößerung, um die gefiederte Nervation zu zeigen.

### Tafel II.

- Fig. 1—4. *Goniopteris polypodioides* Ettingsh.; Fig. 1 Mittelstück eines Wedels, an welchem man die Einfügung einiger Fiedern gewahrt; Fig. 2 ein ähnliches Exemplar mit deutlich entwickelten den Nervenästchen aufsitzenden Fruchthäufchen; Fig. 3 und 4 Exemplare von Fiedern, steril, mit vorzüglich erhaltener Nervation; Fig. *a* die sterile, Fig. *b* die Sporangien tragende Nervation in schwacher Vergrößerung dargestellt.
- Fig. 5—8. *Sphenopteris eocenica* Ettingsh.; Fig. 5 Wedelfragment eines älteren Exemplares, mit entfernter gestellten und stärker entwickelten Fiedern; Fig. 6 und 7 Endtheile jüngerer Wedel mit verkürzten, an der Basis zusammenhängenden Fiedern; Fig. 8 Seitenfiedern eines grösseren, wohl ausgebildeten Wedels; Fig. *c* ein Fiederehen von letztgenanntem Exemplare, schwach vergrößert, zur Darstellung der Nervationsverhältnisse.

### Tafel III.

- Fig. 1. *Zosterites affinis* Ettingsh.; Blatt- und Stengelreste einer Zosteren ähnlichen Najadee.
- Fig. 2, 3. *Flabellaria Latania* Rossm.; Fig. 2 Mittelstück der Blattfläche eines grossen Blattes, an welchem man die Anheftung der am Grunde verwachsenen Fiedern an die bereits sehr dünne Spindel noch deutlich wahrnimmt; Fig. 3 Fragment einer Fieder.
- Fig. 4. *Flabellaria raphifolia* Sternb., Mitteltheil eines jungen Blattes, ziemlich schlecht erhalten; man sieht jedoch deutlich den Ansatz der am Grunde zusammenhängenden Fiedern an das kleine abgerundete Köpfchen der sehr kurzen Spindel.
- Fig. 5. *Goniopteris polypodioides* Ettingsh., Fragmente von sterilen und von fructificirenden Fiedern mit vorzüglich schön erhaltener Nervation.

### Tafel IV.

- Fig. 1—3. Blattreste der *Flabellaria Latania* Rossm. aus den Mioeenschichten von Altsattel in Böhmen.

### Tafel V.

- Fig. 1—3. *Araucarites Sternbergii* Göpp.; Fig. 1 und 2 Fragmente von älteren Zweigen, deren Ästchen mehr abstehen und mit grösseren, sparrigen Blättern besetzt sind; Fig. 3 Exemplar eines wohl erhaltenen jungen Zweigchens, dessen verlängerte mit kürzeren und mehr anliegenden Blättern besetzten Ästchen grosse Ähnlichkeit mit *Dacrydium cupressinum* bedingen.

### Tafel VI.

- Fig. 1—8. *Daphnogene polymorpha* Ettingsh.; Fig. 1—6 grössere Blattformen mit vorzüglich schön erhaltener Nervatur; Fig. 7, 8, Annäherungsformen zu *Daphnogene lanceolata* Ung.
- Fig. 9—12. *Daphnogene grandifolia* Ettingsh.; Fig. 9 oberer Theil eines grossen eilanzettlichen Blattes; Fig. 10 Mitteltheil eines grösseren elliptischen Blattes; Fig. 11, 12 Fragmente kleinerer eiförmiger Blätter.



**Tafel VII.**

- Fig. 1—6. *Daphnogene polymorpha* Ettingsh.; Blattformen von verschiedener Grösse und Entwicklung; Fig. 1 und 2 normale und am häufigsten vorkommende Formen; Fig. 3—6 schmalere und kleinere Blätter, Übergangsformen zu *Daphnogene lanceolata* Ung.  
 Fig. 7. *Daphnogene lanceolata* Ung.; Fig. 10 Blattfragment mit stärker entwickelten oberen Secundärnerven.  
 Fig. 8. Blatt von *Daphnogene cinnamomifolia* Ung.; die genäherten, querläufigen Tertiärnerven sind sehr deutlich ausgeprägt.  
 Fig. 9. *Laurus pachyphylla* Ettingsh.  
 Fig. 10. *Artocarpidium Ephialtae* Ettingsh.  
 Fig. 11. *Ficus dalmatica* Ettingsh.  
 Fig. 12—14. *Banksia longifolia* Ettingsh.  
 Fig. 15. *Dryandroides hakuefolia* Ung.  
 Fig. 16. *Banksia haeckingiana* Ettingsh.

**Tafel VIII.**

Blattformen von *Banksia longifolia* Ettingsh.

**Tafel IX.**

- Fig. 1. Blatt von *Rhododendron Saturni* Ettingsh.  
 Fig. 2. *Bumelia oblongifolia* Ettingsh.  
 Fig. 3. Kleineres Blatt von *Santalum osyrium* Ettingsh.  
 Fig. 4. Blatt von *Sapotacites ambiguus* Ettingsh., dessen besonders stark hervortretender Rand die derbe lederartige Textur ausspricht.  
 Fig. 5—9. *Banksia dillenoides* Ettingsh.; Fig. 5 kleineres Blatt, der *Banksia Ungerii* Ettingsh. in der Form sehr nahe kommend und nur durch die stärkeren und enfternter gestellten Secundärnerven von derselben zu unterscheiden;  
 Fig. 6 Endtheil eines grösseren Blattes; Fig. 8, 9 verschiedene sich ergänzende Blatt-Fragmente mit schön erhaltener Nervation.  
 Fig. 10. *Sapotacites Daphnes* Ettingsh.; kleineres Blatt, das einzige Exemplar dieser zu Parschlug sehr häufigen Art, welches hier aufgefunden wurde.  
 Fig. 11. Blatt von *Andromeda protogaea* Ung.  
 Fig. 12. *Gautiera eocenica* Ettingsh.  
 Fig. 13. *Celastrus Phlegthontis* Ettingsh.  
 Fig. 14. *Apocynophyllum plumeriacifolium* Ettingsh.  
 Fig. 15—16. *Dombeyopsis Phillyrae* Ettingsh.  
 Fig. 17. *Celastrus oreophilus* Ung.  
 Fig. 18, 19. *Ceanothus zizyphoides* Ung.

**Tafel X.**

- Fig. 1. Fragment eines grösseren Blattes von *Nelumbium nympheoides* Ettingsh., an welchem der spitze Ausschnitt an der Basis vollkommen deutlich erhalten ist.  
 Fig. 2, 3. *Nelumbium Buchii* Ettingsh., Fragmente von kleineren Blättern mit deutlich sichtbarer Einfügungsstelle des mächtigen Blattstiels.

**Tafel XI.**

- Fig. 1. Fragment eines grösseren Blattes von *Nelumbium Buchii* Ettingsh.  
 Fig. 2. Fragment eines Blattes von *Nelumbium nympheoides* Ettingsh., mit vorzüglich erhaltener Nervation.

**Tafel XII.**

- Fig. 1. Grosses Blatt von *Nelumbium Buchii* Ettingsh., mit ziemlich vollständigem, ganzen Blattrande und schön erhaltener Nervatur.

**Tafel XIII.**

- Fig. 1. Blattfragment von *Malpighiastrum dalmaticum* Ettingsh.  
 Fig. 2, 3. Blätter von *Rhamnus Roesleri* Ettingsh. Bei Fig. 2 ist die wohl erhaltene Nervation, bei Fig. 3 die derbe, lederartige Beschaffenheit des Blattes ersichtlich gemacht.  
 Fig. 4. Blättchen von *Sophora europaea* Ung.  
 Fig. 5. Blättchen von *Dalbergia primavera* Ung.  
 Fig. 6. Blättchen von *Cassia ambigua* Ung.  
 Fig. 7. Blättchen von *Cassia Thiae* Ettingsh.; nebst dem schärfer ausgesprochenen Mediannerven fällt insbesondere die Querrunzelung des kurzen Stielchens auf.  
 Fig. 8—13. Phyllodien von *Eucalyptus oceanica* Ung.; Fig. 8 und 9 grössere Blattformen mit ziemlich vollständig erhaltenen Stielen. Der scharf hervortretende Mediannerv und Rand deutet auf die derbere lederartige Beschaffenheit des Blattes.  
 Fig. 8 zeigt einen etwas gedrehten Stiel, eine Erscheinung, die auch bei den zu Sotzka und Sagor vorkommenden



Blättern dieser Art nicht selten beobachtet werden konnte, und einen flacheren von der Seite ein wenig zusammen-  
gedrückten Blattstiel voraussetzen lässt; Fig. 10 und 13 kleinere Blattformen; Fig. 11—14 stellen die am häufigsten  
erscheinenden Formen dar; Fig. 11 und 14 zeigen die den Eucalyptus-Phyllodien eigenthümliche schiefe, vorgezo-  
gene Basis augenfällig; Fig. 13 mit Andeutung der feinen, selten bemerkbaren Nervatur.

Fig. 16. Blättchen von *Cassia Zephyri* Ettingsh.

Fig. 17. Fragment eines grösseren Fiederblättchens von *Cassia Phascolites* Ung.

Fig. 18—23. *Cassia hyperborea* Ung.; Fig. 18 die normale Form, wie selbe in den Schichten von Parseglug vorkommt;

Fig. 20—23 Übergangsformen zu *Cassia Berenices* Ung.

#### Tafel XIV.

Fig. 1. Blatt von *Flabellaria raphifolia* Sternb., eine Übergangsform zu *Flabellaria Martii* Ung. darstellend.

Fig. 2. Fieder von *Blechnum Braunii* Ettingsh.; Fig. a die wohl erhaltene Nervation des oberen Theiles derselben, in schwa-  
cher Vergrößerung.

Fig. 3. Fiederehen von *Adiantites Schlehani* Ettingsh.

Fig. 4. Fäden von *Confervites capilliformis* Ettingsh., das einzige Exemplar dieser Art, welches in den Schichten des  
Monte Promina aufgefunden wurde.

Fig. 5. 6. Blätter von *Dryandra Brongniartii* Ettingsh.

Fig. 7. Blatt von *Stereulia Labrusca* Ung., Übergangsform zu *Acer sofskianum* Ung.

Fig. 8. *Celastrus Andromedae* Ung.

Fig. 9. *Eucalyptus oceanica* Ung., mit wohl erhaltener Nervation.

Fig. 10. Blatt von *Callistemophyllum melaleucaciforme* Ettingsh.



















Lith. u. gedr. v. d. k. Hof- u. Staatsdruckerei











Lith. u. gedr. im k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

































Vertheilt in d. k. k. Hof- u. Staatsdruckern







pl. 44

Fig. 3 - *Synedra* *Saulfussii* Nees  
= *S. nemoralis* Leger



Lith. u. gedr. d. k. Hof- u. Staatsdruckerei

















